OMEDIT ALSACE

Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD

Agence Régionale de Santé Alsace

Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD

SOMMAIRE

p. 1 Abréviations

p. 2 Notice

p. 4 Méthodologie

p. 151 Index

A. Voies digestives et métabolisme P. 8

Préparations stomatologiques
Médicaments pour les troubles de l'acidité
Médicaments pour les désordres fonctionnels gastro-intestinaux
Antiémétiques et antinauséeux
Laxatifs
Antidiarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux
Médicaments de la digestion, enzymes incluses
Médicaments du diabète
Vitamines
Suppléments minéraux

B. Sang et organes hématopoïétiques P.32

Antithrombotiques
Antihémorragiques
Préparations antianémique

C. Système cardio-vasculaire P.39

Médicaments en cardiologie
Diurétiques
Vasculoprotecteurs
Bétabloquants
Inhibiteurs calciques
Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine
Agents modifiant les lipides

D. Médicaments dermatologiques P.59

Antifongiques à usage dermatologique
Emollients et protecteurs
Médicaments contre le psoriasis
Antibiotiques et chimiothérapies à usage dermatologique
Corticoïdes et préparations dermatologiques
Antiseptiques et désinfectants

G. Système génito-urinaire et hormones sexuelles P.72
Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique
Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale
Médicaments urologiques

H. Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues P.77
Corticoïdes à usage systémique
Médicaments de la thyroïde
Hormone pancréatique

J. Anti-infectieux généraux à usage systémique P.81
Antibactériens à usage systémique
Antimycosiques à usage systémique
Antiviraux à usage systémique

L. Antinéoplasiques et immunomodulateurs P.94
Thérapeutiques endocrines

M. Muscle et squelette P.96
Topiques pour douleurs articulaires et musculaires
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux
Antigoutteux
Médicaments pour le traitement des désordres osseux

N. Système nerveux P.104
Anesthésiques
Analgésiques
Antiépileptiques
Antiparkinsoniens
Psycholeptiques
Psychoanaleptiques

R. Système respiratoire P.138
Préparations nasales
Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes
Médicaments de la toux et du rhume
Antihistaminiques à usage systémique

S. Organes sensoriels P.146
Médicaments ophtalmologiques
Médicaments otologiques

LES ABREVIATIONS UTILISEES DANS CETTE LISTE

A

AINS :	anti-inflammatoires non stéroïdiens
Amp. :	ampoule
AVK :	anti-vitamine K
ARA II :	antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II

C

Cp. :	comprimé

F

fl. :	flacon

G

g :	gramme

H

h :	heure

I

IC :	insuffisance cardiaque
IEC :	inhibiteur de l'enzyme de conversion
IH :	insuffisance hépatique
IM :	intra-musculaire
INR :	international normalized ratio
IPP :	inhibiteur de la pompe à proton
IR :	insuffisance rénale
IV :	intra-veineux

J

j. :	jour

M

mg :	milligramme
ml :	millilitre

N

ng :	nanogramme

S

Sach. :	sachet
SC :	sous-cutané
Susp. :	suspension
SMR :	service médical rendu
Sol. :	solution

T

t° :	température ambiante
tb. :	tube

Autres

µg :	microgramme
/!\ :	attention vigilance
> :	supérieur
< :	inférieur

U

U ou UI :	unité internationale

Objectifs :

L'Agence régionale de la santé d'Alsace vise à l'excellence du système de santé. A travers son Plan Stratégique Régional de Santé, elle positionne l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la gestion des risques parmi ses priorités d'action. Cette priorité déclinée dans le Schéma Régional d'Organisation Médico-Social visera, par exemple, à sécuriser le circuit du médicament notamment en EHPAD.

En effet, le médicament est une source importante d'évènements indésirables graves et le sujet âgé polypathologique et polymédiqué présente un risque accru d'iatrogénie médicamenteuse.

La prescription, première étape du circuit du médicament, peut être optimisée lorsqu'elle s'effectue à partir d'un panel de molécules sélectionnées pour leur rapport bénéfice/risque favorable et couvrant la majorité des pathologies susceptibles de toucher la population concernée.

L'élaboration d'une Liste Préférentielle de Médicaments adaptée aux Personnes Agées (LPM-PA) en EHPAD s'inscrit dans cette démarche de réduction du risque iatrogénique.

L'objectif de cette LPM-PA est de servir de support aux EHPAD sans PUI dans la réalisation de leur propre liste.

Cette liste régionale est donc à adapter en fonction des besoins de votre établissement.

Mode d'emploi :

AVERTISSEMENT : Ce livret, dont les données sont issues d'un consensus d'experts et sont basées sur la pratique, rassemble des informations de diverses sources destinées à faciliter l'utilisation quotidienne. Il s'agit d'un outil pragmatique, diffusé à titre d'information, et qui ne se substitue pas aux mentions légales (RCP).

Vous trouverez ci-dessous une suggestion d'étapes chronologiques à suivre pour adapter aisément cette liste à votre établissement.


Exemple de critères :
efficacité, Service Médical rendu, sécurité d'utilisation, coût, présence de générique, facilité d'utilisation, forme galénique, spécificité des résidents…
Validation des critères de choix des médicaments qui figureront sur la liste
Trier la liste initiale avec les critères retenus
Exemple : classe A, sous-classe chimique des inhibiteurs de la pompe à protons la liste présente 4 molécules différentes (ésoméprazole, lanzoprasole, ompérazole, pantoprazole) avec plusieurs spécialités, ne retenir que la ou les molécule(s) parmi les quatre satisfaisant vos critères.
Suppression/ajout des molécules sur le fichier excel
Liste finale
Mettre à jour périodiquement la liste

La procédure de prescription hors livret reste une possibilité. La tracer et en analyser le bilan peut être un moyen d'améliorer périodiquement l'adaptation de votre liste.

L'OMEDIT Alsace, dans son rôle d'accompagnement des établissements, a porté l'élaboration d'une liste préférentielle de médicaments adaptés à la personne âgée.

Dans un premier temps, une liste préliminaire de molécules a été construite à partir d'une compilation des livrets thérapeutiques provenant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans pharmacie à usage intérieur (PUI) de la région. Cette liste a ensuite été analysée par un panel d'experts à l'aide d'une méthode de consensus Delphi à deux tours. Ils étaient invités à évaluer le caractère approprié ou non de chaque molécule pour le sujet âgé selon une échelle nuancée à cinq items. Conjointement à cette évaluation, une analyse de la littérature a été réalisée au sujet des médicaments inappropriés en gériatrie.

Au total, 252 molécules ont été retenues.

La LPM-PA est présentée par intitulé de chapitre de la classification ATC (classe anatomique), au total il y a 12 classes.

Les molécules sont classées par ordre alphabétique et selon la classification ATC.

Pour vous repérer dans une classe anatomique, des couleurs ont été choisies pour différencier les différents niveaux :

Sous-classe pharmacologique

Sous-classe thérapeutique

Sous-classe chimique

A noter que certaines sous-classes n'ont pas été reprises lorsqu'elles étaient répétées sur deux niveaux qui se suivent, par souci de clarté.

Pour chaque classe anatomique, les informations suivantes sont réparties dans 9 colonnes :

1ère colonne : DCI (dénomination commune internationale).

2ème colonne : Spécialité de référence - dénomination commerciale. Pour la plupart des molécules, les spécialités de référence ont été mentionnées de manière exhaustive. Cependant, dans certains cas, quand le nombre de spécialités était trop important, les noms de spécialité retenus sont ceux présents dans les livrets thérapeutiques analysés au niveau régional.

3ème colonne : Générique. Pour une molécule donnée, l'existence ou non d'un générique a été noté.

4ème colonne : SMR (Service Médical rendu). Le SMR le plus récent a été relevé. Certaines spécialités bénéficient de plusieurs SMR en fonction des indications. Dans cette situation, tous les SMR ont été notés mais sans reprendre les indications pour éviter de surcharger le document.

5ème colonne : Dosages. Les dosages ont été repris de façon exhaustive dans la LPM-PA pour les spécialités et les formes galéniques présentées. Les formes pédiatriques ont été écartées.

6ème colonne : Formes galéniques. Pour chaque spécialité, les formes pharmaceutiques couramment rencontrées en EHPAD ont été listées. Les spécialités sont déclinées sous plusieurs formes galéniques administrables par voie orale (comprimé, gélule, solution buvable…). Sauf exception, la voie injectable n'a pas été retenue lorsqu'une spécialité était disponible par voie orale (comprimé, solution buvable…).

7ème colonne : Modalités d'administration. La voie d'administration a été notée pour chaque spécialité (voie orale, auriculaire, inhalation,…) ainsi que les moments de prise par rapport au repas (avant, pendant ou après). En ce qui concerne les formes orales sèches, la possibilité ou non d'écraser un comprimé ou d'ouvrir une gélule a été rapportée.

8ème colonne : Sélection d'informations utiles. Les informations ont été sélectionnées en fonction de l'utilité qu'elles pouvaient apporter pour la grande majorité des résidents en EHPAD.

- La durée de conservation précisée pour les formes orales liquides après la première ouverture du flacon.
- La teneur en sucre, sodium, potassium et éthanol mentionnée pour les spécialités qui en contiennent de façon significative et qui pourraient avoir un effet sur le patient selon son état clinique.
- Des mesures hygiéno-diététiques inscrites quand le produit l'exigeait.
- Une attention particulière a été portée aux AVK. Ainsi, lorsqu'une interaction médicamenteuse des AVK était connue avec un des médicaments de la liste, il a été spécifié de contrôler l'INR.
- Pour les molécules jugées inappropriées par la littérature et retrouvées dans la liste, les arguments mis en avant ont été reproduits dans cette rubrique (les surveillances cliniques à prévoir, les alternatives thérapeutiques...).

9ème colonne : IR et IH. L'attention du prescripteur est attirée par le symbole /!\ lorsque la fonction rénale ou hépatique altérée doit conditionner la prescription. Ainsi, les molécules contre-indiquées pour ces populations, nécessitant une adaptation de posologie ou pour lesquelles il y a absence de données, ont été relevées.

Pour faciliter la navigation, des liens ont été ajoutés au niveau du sommaire vers la classe anatomique qui vous intéresse ainsi que vers les sous-classes thérapeutiques. De même, l'index des substances actives vous permet de vous retrouver directement sur la substance active qui vous intéresse en cliquant dessus.

Sources utilisées :

Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : consultation de la base Thériaque jusqu'au mois de juillet 2012.

Concernant les modalités d'administration, certaines données ont été reprises de la liste des comprimés pouvant être écrasés et des gélules pouvant être ouvertes élaborée par l'OMEDIT Haute-Normandie.

Certaines durées de conservation, absentes des RCP ont été retrouvées dans la liste « conservation des liquides oraux » établie par les Hôpitaux universitaire de Genève ou bien après contact téléphonique directement auprès du laboratoire.

Les informations ne provenant pas des mentions légales sont en italique dans le document.

Le groupe d'experts ayant participé à l'élaboration de la LPM-PA :

Pharmaciens :
Dr. Marie AUBE (Pharmacien de PUI, UGECAM-Alsace)
Dr. Benoît BERGAENTZLE (Pharmacien d'officine, Mulhouse)
Dr. Anne-Marie BOSSERT (Pharmacien de PUI, CH Obernai)
Drs. Jean-Philippe DANIEL et Bénédicte GOURIEUX (Pharmaciens de PUI, CHRU Strasbourg)
Drs. Eva DELAGO et María MUÑOZ GARCIA (Pharmaciens PUI, Hôpital Universitaire Ramón et Cajal, Madrid)
Dr. Mohamed El AATMANI (Pharmacien de PUI, CH Bischwiller)
Dr. Daniel GUILLARD (Pharmacien de PUI, CH Mulhouse)
Dr. Francoise GUILLARD (Pharmacien de PUI, Diaconat, Mulhouse)
Pr. Christiane HEITZ (Professeur de Pharmacie clinique, Faculté de pharmacie, Université de Strasbourg)
Dr. Franck KESSLER (Pharmacien d'officine, Morsbronn-les-Bains et Membre de l'URPS Alsace)
Dr. Nhôn LAM (Pharmacien de PUI, CH Pfastatt)
Dr. Catherine LUTTRINGER (Pharmacien de PUI, HIVA Sainte-Marie-aux-Mines)
Dr. Laurent PERELLO (Pharmacien de PUI, CDRS, Colmar)
Drs. Michel PIMBEL et Julien DELEDIQUE (Pharmaciens d'officine, Turckheim)
Dr. Jean-Marc TOSI (Pharmacien de PUI, CH Erstein)
Dr. Philippe TURNANI (Pharmacien d'officine, Reiningue)
Dr. Claude WINDSTEIN (Pharmacien d'officine, La Petite Pierre)

Médecins :

Pr. Jean Pierre BAEYENS (Gériatre, Professeur à l'université de Luxembourg, Belgique)

Dr. Lionel BENDAVID (Médecin Coordonnateur, Résidence Hirschler)

Pr. Christophe BULA (Chef de service de gériatrie CHUV de Lausanne)

Dr. William CALLET (Gériatre, PH, CH Sélestat)

Dr. Karen CAYRON (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Oberhausbergen)

Dr. Philippe CLAUDE (Gériatre, Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Strasbourg)

Dr. Félix COHEN (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Mulhouse)

Dr. Gabrielle DE GUIO (Gériatre, GHSV) et le staff de gériatrie du GHSV

Dr. Alain HEITZ (PH, Oncogériatre, CHRU Strasbourg)

Dr. Maurice HERTZOG (Gériatre, Chef du département gériatrie, Groupe Hospitalier Centre Alsace)

Dr. Roselyne ILTIS (Gériatre, Chef de pôle médecine et réadaptation, CH Bischwiller)

Pr. Jean-Louis IMBS (Pharmacologue, Consultant, CHRU Strasbourg)

Pr. Georges KALTENBACH (Gériatre, Chef de pôle gériatrie, CHRU Strasbourg)

Dr. Patrick KARCHER (PH service de gériatrie, CHRU Strasbourg)

Dr. Dominique LANG (PH, Gériatre, HL Molsheim)

Dr. Pierre-Olivier LANG (Gériatre, Hôpitaux universitaire de Genève)

Dr. Anne LEVASSEUR-GOETZ (Médecin Coordonnateur, Strasbourg)

Dr. Michel LEVEQUE (Gériatre, Médecin Généraliste, Thann)

Dr. Alain LION (Gériatre, gestionnaire d'EHPAD, Lutterbach)

Dr. Joëlle MARCHAL-FENNINGER (Gériatre, PH, CH Bischwiller)

Dr. Pascal MEYVAERT (Gériatre Médecin Généraliste, Gerstheim; Médecin Coordonnateur, Rhinau; Président de l'AMCEAL)

Dr. Jean-Marc MICHEL (Chef de pôle de gérontologie clinique, CH Colmar)

Dr. Caroline OULERICH (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Drusenheim)

Dr. Yves PASSADORI (PH, Service de gériatrie, Médecin coordonnateur, CH Mulhouse)

Dr. Max PRUDENT (Gériatre, service de gériatrie, CHU Reims)

Dr. Marcel RUETSCH (Gériatre, Médecin généraliste, Dessenheim)

Dr. Thierry SCHERER (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Ruffenach)

Dr. Pierre-Paul SCHLEGEL (Médecin Généraliste, Kingersheim, Président de l'URML-Alsace)

Dr. Alexandre SIMALEU (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Hôpital de Rixheim)

Dr. Martine STEFFEN (Gériatre, Médecin Coordonnateur, Mulhouse)

Dr. Martine TEBACHER (PH, Centre Régional de Pharmacovigilance, CHRU Strasbourg)

Pr. Jean-Marie VETEL (Gériatre, PH service de gériatrie, CH du MANS)

Pr. Thomas VOGEL (Gériatre, CHRU Strasbourg)

Dr. Luc WALTER (Médecin Généraliste, Médecin coordonnateur, Bergheim)

Dr. Marie WELSCH (PH, Centre Régional de Pharmacovigilance, CHRU Strasbourg)

Dr. Martine ZEISSER (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Moosch).

A. Voies digestives et métabolisme



Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Préparations stomatologiques									
Anti-infectieux pour traitement oral local									
Chlorhexidine + chlorobutanol	ELUDRIL®	oui	modéré	0,5 ml/100 ml 0,5 g/100 ml	Sol. pour bain de bouche (fl. 90 ml)	A utiliser en bain de bouche après dilution dans de l'eau.	Tenir compte de la présence d'éthanol. *Conservation : 2 semaines à t° ambiante après première ouverture.*		
Médicaments pour les troubles de l'acidité									
Antiacides									
Bicarbonate de sodium + alginate	GAVISCON®	oui	faible	250 mg/5 ml	Susp. buvable (sach. 10 ml, fl. 250 ml)	A administrer à distance des autres médicaments (minimum 2h).	Tenir compte de la teneur en sodium. Conservation : 3 mois après ouverture.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Bicarbonate de sodium + alginate	GAVISCON® Menthe	non	faible	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler. A administrer après les repas.	Tenir compte de la teneur en sodium.		
Médicaments pour l'ulcère gastro-duodénal et le reflux gastro-oesophagien									
Inhibiteurs de la pompe à protons									
Esoméprazole	INEXIUM®	oui	important	20 mg 40 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules.			/!\
Lanzoprazole	LANZOR® OGAST®	oui	important	15 mg 30 mg	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Possibilité d'ouvrir la gélule et diluer dans un liquide ou un aliment. A administrer au moins 30 minutes avant les repas.			/!\
Lanzoprazole	OGASTORO®	non	important	15 mg 30 mg	Cp. orodispersible	A avaler avec de l'eau. Possibilité de laisser fondre sur la langue ou de disperser dans de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. A administrer 30 minutes avant les repas.			/!\

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Oméprazole	MOPRAL®	oui	important	10 mg 20 mg 40 mg	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. Possibilité d'ouvrir la gélule et de mélanger le contenu avec un aliment acide.			/!\
Oméprazole	ZOLTUM®	oui	important	10 mg 20 mg	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. Possibilité d'ouvrir la gélule et de mélanger avec un aliment acide.			/!\
Pantoprazole	EUPANTOL® INIPOMP®	oui	important	20 mg 40 mg	Cp. gastro-résistant	A administrer à jeun avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.			/!\

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres médicaments pour les troubles de l'acidité									
Diosmectite	SMECTA®	non	modéré / faible	3 g	Susp. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans un verre d'eau. A administrer à distance de tout autre médicament : - après les repas dans les oesophagites. - à distance des repas dans les autres indications.			
Médicaments pour les désordres fonctionnels gastro-intestinaux									
Autres médicaments pour les troubles de l'acidité									
Phloroglucinol	SPASFON®	non	faible	80 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.			
Phloroglucinol	SPASFON LYOC®	oui	faible	80 mg 160 mg	Lyophilisat oral	A laisser fondre sous la langue ou avaler après dissolution dans un verre d'eau.			
Phloroglucinol	SPASFON®	oui	faible	150 mg	Suppositoire	A administrer par voie rectale.			

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Stimulants de la motricité intestinale									
Dompéridone	MOTILIUM® PERIDYS®	oui	modéré / insuffisant	10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer avant les repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer MOTILIUM® suspension buvable ou lyophilisat oral.	/!\	/!\
Dompéridone	MOTILIUM®	oui	modéré / insuffisant	1 mg/ml	Susp. buvable (fl. 200 ml)	A prendre par voie orale. A administrer avant les repas.	Conservation : 3 mois après ouverture.	/!\	/!\
Dompéridone	Génériques	oui	modéré / insuffisant	10 mg	Cp. orodispersible	A avaler avec de l'eau. Possibilité de laisser fondre sur la langue. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer avant les repas.		/!\	/!\

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antiémétiques et antinauséeux									
Scopolamine [L]	SCOPODERM TTS®	non	non remboursé	1 mg/72 h	Dispositif transdermique	A appliquer sur la peau sèche, saine et dépourvue de poils. Nettoyer le lieu d'application après chaque pose. Se laver les mains après chaque pose.	Place de la scopolamine dans cette rubrique au regard de la classification ATC. Cependant, l'indication considérée est le traitement en soins palliatifs des râles agoniques liés à l'encombrement des voies aériennes supérieures par excès de sécrétions salivaires. Inapproprié selon la liste de Laroche dans l'indication digestive.	/!\	/!\
Laxatifs									
Laxatifs lubrifiants									
Huile de paraffine [B P]	LANSOYL® (framboise)	non	non remboursé	78,23 g/100 g	Gel oral (unidose et pot 225 g)	A administrer en dehors d'un repas. Ne pas s'aliter dans les deux heures suivant la prise.	Ne pas utiliser de façon prolongée : réduit l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Tenir compte de la teneur en sucre. Tenir compte du délai d'action (6 à 8h). Inapproprié selon la liste de Beers et Priscus : risque d'inhalation. Autre alternative disponible : laxatifs osmotiques.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Huile de paraffine B P	LANSOYL® (sans sucre)	non	non remboursé	78,23 g/100 g	Gel oral (pot 215 g)	A administrer en dehors d'un repas. Ne pas s'aliter dans les deux heures suivant la prise.	Ne pas utiliser de façon prolongée: réduit l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Tenir compte du délai d'action (6 à 8h). Inapproprié selon la liste de Beers et Priscus : risque d'inhalation. Autre alternative disponible : laxatifs osmotiques.		
Laxatifs de lest									
Gomme sterculia	NORMACOL®	non	faible	62 g/100 g	Granulé enrobé (sach.)	A avaler avec un grand verre d'eau. Ne pas croquer. A administrer après un repas. Ne pas s'allonger après la prise.	Tenir compte de la teneur en sucre. S'assurer que la ration hydrique est suffisante.		
Psyllium	TRANSILANE®	non	faible	2,816 g	Susp. buvable (poudre en sach.)	A agiter et à boire immédiatement après dilution dans un verre d'eau. A administrer avant un repas.	Tenir compte de la teneur en potassium et en sucre.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Psyllium	TRANSILANE® (sans sucre)	non	faible	3 g	Susp. buvable (poudre en sach.)	A agiter et à boire immédiatement après dilution dans un verre d'eau. A administrer avant un repas.	Tenir compte de la teneur en sucre (fructose).		
Laxatifs osmotiques									
Lactulose	DUPHALAC®	oui	modéré	10 g/15 ml	Sol. buvable (sach. 15 ml, fl. 100 ml)	Voie orale : à avaler pur ou dilué dans une boisson.	*Conservation : 2 semaines après ouverture.* Ne pas mettre au réfrigérateur (risque de cristallisation).		
Macrogol (4000)	FORLAX®	oui	modéré	10 g	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans un verre d'eau.			
Macrogol (3350) + bicarbonate de sodium + chlorure de potassium + chlorure de sodium	TRANSIPEG®	non	modéré	2,95 g 5,9 g	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans de l'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium et en potassium.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Macrogol (3350) + bicarbonate de sodium + chlorure de potassium + chlorure de sodium	MOVICOL® (chocolat, citron, sans arôme)	non	modéré	13,125 g	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler juste après dilution dans de l'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium et en potassium.		
Lavements									
Phosphate monosodique et disodique	NORMACOL® Lavement	non	important / faible	23,66 g + 10,4 g	Sol. rectale (unidose)	A administrer par voie rectale. Ne pas avaler. Rester allongé pendant l'administration.		/!\	
Sorbitol + citrate de sodium + laurylsulfoacétate de sodium	MICROLAX®	non	non remboursé	4,465 g	Sol. rectale (unidose)	A administrer par voie rectale.			
Autres									
Bicarbonate de sodium + bitartrate de potassium	EDUCTYL®	non	insuffisant	0,7 g/1,15 g	Suppositoire effervescent	A administrer par voie rectale.			

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-diarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux									
Autres anti-diarrhéiques									
Racécadotril	TIORFAN®	non	modéré	100 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. A administrer au début d'un repas. *Ouverture possible de la gélule mais goût désagréable.*		/!\	/!\
Médicaments de la digestion, enzymes incluses									
Préparations enzymatiques									
Poudre de pancréas	CREON®	non	important	12.000 U 25.000 U 40;000 U	Gélule gastro-résistante	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule pour mettre les microgranules dans de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. A administrer au cours des repas.	Maintenir une bonne hydratation en période de chaleur.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments du diabète									
Insulines et analogues									
Insulines et analogues pour injection d'action rapide									
Insuline asparte[B]	NOVORAPID®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl.10 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline asparte[B]	NOVORAPID® Flexpen	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insuline asparte[B]	NOVORAPID® Penfill	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline glulisine[B]	APIDRA®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline glulisine[B]	APIDRA® Solostar	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insuline glulisine[B]	APIDRA®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline humaine recombinante solution[B]	UMULINE® Rapide	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC, IM, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline humaine recombinante solution[B]	UMULINE® Rapide	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC, IM, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insuline humaine recombinante solution[B]	ACTRAPID®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 30 minutes avant un repas.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inadapté pour les pompes à insuline : risque de cristallisation. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline humaine recombinante solution[B]	ACTRAPID® Penfill	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC, IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 30 minutes avant un repas.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inadapté pour les pompes à insuline : risque de cristallisation. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline lispro[B]	HUMALOG®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insuline lispro[B]	HUMALOG® Pen	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		
Insuline lispro[B]	HUMALOG®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC (bolus ou perfusion continue) ou par voie IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 : risque augmenté d'hypoglycémie.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insulines et analogues pour injection d'action intermédiaire, début d'action rapide									
Insuline asparte	NOVOMIX® Penfill	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (cartouche 3 ml)	Agiter avant emploi. A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
Insuline asparte	NOVOMIX® (30, 50, 70) Flexpen	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (stylo 3 ml)	Agiter avant emploi. A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer immédiatement avant un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insuline humaine recombinante solution et isophane	MIXTARD® 30	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (fl. 10 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV et en IM. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 30 minutes avant le repas/collation.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après ouverture.		
Insuline lispro	HUMALOG® MIX (25, 50)	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 15 minutes avant ou après un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
Iinsuline lispro	HUMALOG® MIX (25, 50) kwikpen	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (stylo 3 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse. A administrer 15 minutes avant ou après un repas.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Insulines et analogues pour injection d'action lente									
Insuline détémir	LEVEMIR®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (3 ml : cartouche, FlexPen, Innolet, Penfill)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV et IM. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture. Inadapté aux pompes à insuline : risque de cristallisation.		
Insuline glargine	LANTUS®	non	important	100 U/ml	Sol. injectable (cartouche 3 ml, fl. 10 ml, Optiset 3 ml, Solostar 3 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
Insuline humaine recombinante isophane	UMULINE® NPH	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (fl. 10 ml, Pen 3 ml, cartouche 3 ml)	A administrer par voie SC et IM. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 4 semaines à t° ambiante après première ouverture.		
Insuline humaine recombinante isophane	INSULATARD® NPH	non	important	100 U/ml	Susp. injectable (Flexpen 3 ml, Innolet 3 ml, fl. 10 ml)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV. Changer de site à chaque injection : ceinture abdominale, face antérolatérale de la cuisse, région deltoïdienne, quadrant supéro-externe de la fesse.	Conservation : 6 semaines à t° ambiante après première ouverture.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antidiabétiques oraux									
Biguanides									
Metformine	STAGID®	non	important	700 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Ecrasement possible des comprimés. A administrer au cours ou à la fin d'un repas.		/!\	/!\
Metformine	GLUCOPHAGE®	oui	important	500 mg 850 mg 1000 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours ou à la fin des repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer la metformine solution buvable.	/!\	/!\
Metformine	GLUCOPHAGE®	non	important	500 mg 850 mg 1000 mg	Sol. buvable (poudre en sach.)	A dissoudre dans un verre d'eau jusqu'à obtention d'une solution limpide à légèrement opalescente. Remuer la solution et avaler immédiatement. A administrer au cours ou à la fin des repas.		/!\	/!\

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Sulfamides									
Gliclazide	DIAMICRON®	oui	important	30 mg 60 mg	Cp. à libération modifiée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.		/!\	/!\
Autres									
Répaglinide	NOVONORM®	oui	important	0,5 mg 1 mg 2 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer 15 à 30 minutes avant le repas. *Ecrasement possible des comprimés.*			/!\
Vitamines									
Vitamine D et analogues									
Colécalciférol	UVEDOSE®	non	important	100.000 UI/2 ml	Sol. buvable (amp. 2 ml)	A avaler pur ou dilué dans de l'eau.			
Colécalciférol	ZYMAD®	non	important	200.000 UI/2 ml 80.000 UI/2 ml	Sol. buvable (amp. 2 ml)	A avaler pur ou mélangé à un aliment liquide ou semi-liquide.			

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Colécalciférol	ZYMAD®	non	important	10.000 UI/1 ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 10 ml)	A avaler pur ou mélangé à un aliment liquide ou semi-liquide.	Conservation : 3 mois après ouverture.		
Ergocalciférol	STEROGYL® 15 "A"	non	important	600.000 UI/1,5 ml	Sol. buvable (amp. 1,5 ml)	A diluer dans de l'eau ou du jus de fruit. A administrer par voie orale.	Tenir compte de la teneur en éthanol.		
Ergocalciférol	STEROGYL®	non	important	2.000.000 UI/100 ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 20 ml)	A diluer dans de l'eau ou du jus de fruit. A administrer par voie orale.	Tenir compte de la teneur en éthanol. *Conservation : 3 mois après ouverture.*		
Vitamine C									
Acide ascorbique	VIT. C UPSA®	oui	non remboursé	1 g	Cp. effervescent	A avaler après dissolution dans un verre d'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium.		
Acide ascorbique	LAROSCORBINE ®	oui	non remboursé	1 g	Cp. effervescent	A avaler après dissolution dans un verre d'eau.	Tenir compte de la teneur en sodium.		

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Acide ascorbique	LAROSCORBINE ® (sans sucre)	oui	non remboursé	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler.			
Acide ascorbique	VIT. C UPSA®	oui	non remboursé	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler.			
Acide ascorbique	VIT. C UPSA® (sans sucre)	oui	non remboursé	500 mg	Cp. à croquer	A croquer avant d'avaler.			

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Suppléments minéraux									
Calcium									
Carbonate de calcium	CALCIDOSE®	oui	important	500 mg (exprimé en calcium)	Susp. buvable (poudre en sach.)	A avaler immédiatement après dissolution dans un verre d'eau. A administrer de préférence à distance des repas.	Tenir compte de la teneur en sucre.	/!\	
Carbonate de calcium	OROCAL®	oui	important	500 mg (exprimé en calcium)	Cp. à sucer	A croquer ou à sucer.		/!\	
Calcium en association									
Carbonate de calcium + colécalciférol	OROCAL D3®	oui	important	500 mg (exprimé en calcium) + 200 UI 500 mg (exprimé en calcium) + 400 UI	Cp. à sucer	A croquer ou à sucer.		/!\	
Carbonate de calcium + colécalciférol	CACIT VITAMINE D3®	non	important	1000 mg (exprimé en calcium) + 880 UI	Sol. buvable (granulés effervescents)	A avaler après dissolution dans un verre d'eau. Agiter avant emploi.		/!\	

Voies digestives et métabolisme	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Carbonate de calcium + colécalciférol	CACIT VITAMINE D3®	non	important	500 mg (exprimé en calcium) + 440 UI	Cp. à sucer ou à croquer	A croquer ou à sucer.		/!\	
Carbonate de calcium + colécalciférol	CALTRATE D3®	non	important	600 mg (exprimé en calcium) + 400 UI	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec un grand verre d'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	
Potassium									
Potassium chlorure	DIFFU K®	non	important	600 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. *Ouverture possible de la gélule. Ne pas écraser le contenu. A prendre avec un grand verre d'eau (risque d'ulcération)*	Si impossibilité d'avaler, préférer le potassium Richard® sirop.		
Potassium chlorure	KALEORID®	non	important	600 mg 1000 mg	Cp. enrobé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.			
Potassium gluconate	POTASSIUM RICHARD®	non	important	3%	Sirop (unidose 15 ml, fl. 250 ml)	A avaler pur ou dilué avec de l'eau. A administrer à la fin d'un repas.		/!\	
Potassium gluconate	POTASSIUM GLUCO H2P®	non	important	15%	Sirop (fl. 250 ml)	A avaler pur ou dilué avec de l'eau. A administrer à la fin d'un repas.		/!\	

B. Sang et organes hématopoïétiques



Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antithrombotiques									
Antivitamines K									
Acénocoumarol	MINISINTROM® SINTROM®	non	important	1 mg 4 mg	Comprimé Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. *A administrer à heure fixe.*	Effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR). Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Vigilance sur les médicaments associés et l'apport alimentaire en vitamine K.	/!\	/!\
Fluindione	PREVISCAN®	non	important	20 mg	Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. *A administrer à heure fixe au cours du repas.*	Effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR). Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Vigilance sur les médicaments associés et l'apport alimentaire en vitamine K.	/!\	/!\

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Warfarine	COUMADINE®	non	important	2 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.*	Effectuer régulièrement le contrôle biologique (INR). Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Vigilance sur les médicaments associés et l'apport alimentaire en vitamine K.	/!\	/!\
Groupe de l'héparine									
Enoxaparine	LOVENOX®	non	important	30.000 UI AXa/3 ml 10.000 UI AXa/1 ml 8.000 UI AXa/0,8 ml 6.000 UI AXa/0,6 ml 4.000 UI AXa/0,4 ml 2.000 UI AXa/0,2 ml	Sol. injectable (flacon multidose) Sol. injectable (seringue préremplie)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter par voie IM. Rester allongé pendant l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale et changer de site à chaque injection.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Attention au risque de thrombopénie induite par l'héparine.	/!\	/!\

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Héparine calcique	CALCIPARINE®	non	important	5.000 UI/0,2 ml 7.500 UI/0,3 ml 12.500 UI/0,5 ml 20.000 UI/0,8 ml 25.000 UI/1 ml	Sol. injectable (amp. ou seringue préremplie)	A administrer par voie SC. Ne pas injecter par voie IM. Rester allongé pendant l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale. Changer de site à chaque injection.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Attention au risque de thrombopénie induite par l'héparine.		
Tinzaparine	INNOHEP®	non	important	18.000 UI AXa/0,9 ml 14.000 UI AXa/0,7 ml 10.000 UI AXa/0,5 ml 4.500 UI AXa/0,45 ml 3.500 UI Axa/0,35 ml 2.500 UI Axa/0,25 ml	Sol. injectable (seringue préremplie)	A administrer par voie IV et SC. Ne pas injecter par voie IM et par voie intravasculaire. Rester allongé pendant l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale. Changer de site à chaque injection.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Attention au risque de thrombopénie induite par l'héparine.	/!\	/!\
Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire									
Acide acétylsalicylique	KARDEGIC®	non	important	75 mg 160 mg 300 mg	Sol. buvable (poudre en sach.)	A avaler après dissolution dans de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Clopidogrel	PLAVIX®	oui non	important	75 mg 300 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. *Ecrasement possible des comprimés. Principe actif sensible à la lumière.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Autre antithrombotique									
Fondaparinux	ARIXTRA®	non	important	10 mg/0,8 ml 7,5 mg/0,6 ml 5 mg/0,4 ml 2,5 mg/0,5 ml	Sol. injectable (seringue préremplie)	A administrer par voie SC profonde. Ne pas injecter par voie IM. Rester allongé pendant et après l'administration. Injecter dans la ceinture abdominale. Changer de site à chaque injection.		/!\	/!\
Antihémorragiques									
Vitamine K									
Phytoménadione	VITAMINE K1®	non	important	10 mg/1 ml	Sol. buvable et injectable (amp. 1 ml)	A administrer par voie orale ou injectable (IV ou IM) suivant la prescriprtion.	Ne pas utiliser une ampoule dont le contenu serait devenu trouble ou présenterait deux phases séparées.		

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Préparations antianémiques									
Préparations martiales									
Fumarate ferreux[B]	FUMAFER®	non	important	66 mg (exprimé en fer)	Cp. pelliculé	A administrer en plusieurs prises par jour. L'horaire et la répartition des prises est à adapter en fonction de la tolérance digestive.	La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer. *Si impossibilité d'avaler, préférer le FUMAFER® en poudre orale.* Inapproprié selon la liste de Beers à des doses > à 325 mg de sulfate ferreux/j (soit en fer 120 mg) : la quantité absorbée n'augmente pas de façon systématique mais le risque de constipation est plus élevé.		

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Fumarate ferreux[B]	FUMAFER®	non	important	33 mg/1 g (exprimé en fer)	Poudre orale (fl. 50 g)	Utiliser la cuillère mesure pour prélever la poudre. A avaler après dilution dans l'eau. A administrer avant un repas.	Tenir compte de la teneur en sucre. La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer. Conservation : 60 jours après ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers à des doses > à 325 mg de sulfate ferreux/j (soit en fer 120 mg) : la quantité absorbée n'augmente pas de façon systématique mais le risque de constipation est plus élevé.		
Sulfate ferreux[B]	TARDYFERON®	non	important	80 mg (exprimé en fer)	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant les repas.	La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer. *Si impossibilité d'avaler, préférer le FUMAFER® en poudre orale.* Inapproprié selon la liste de Beers à des doses > à 325 mg de sulfate ferreux/j (soit en fer 120 mg) : la quantité absorbée n'augmente pas de façon systématique mais le risque de constipation est plus élevé.		

Sang et organes hématopoïétiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Sulfate ferreux[B] **+ acide folique**	TARDYFERON B9®	non	important	50 mg (exprimé en fer) + 0,35 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant les repas.	La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer. Inapproprié selon la liste de Beers à des doses > à 325 mg de sulfate ferreux/j (soit en fer 120 mg) : la quantité absorbée n'augmente pas de façon systématique mais le risque de constipation est plus élevé.		
Vitamine B12 et acide folique									
Acide folique	SPECIAFOLDINE ®	oui	important	0,4 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*			
Cyanocobalamine	VITAMINE B12®	non	important	250 µg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés mais administration immédiate car le principe actif est sensible à la lumière.*	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme solution buvable.		
Cyanocobalamine	VITAMINE B12®	non oui non	important	0,1 mg/1 ml 1 mg/2 ml 1 mg/4 ml	Sol. buvable et injectable (amp. 1, 2, 4 ml)	Voie IM ou orale selon l'indication. Par voie orale : à avaler après dissolution dans un verre d'eau.			

C. Système cardio-vasculaire



Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments en cardiologie									
Glucosides cardiotoniques									
Digoxine P B L	HEMIGOXINE® DIGOXINE®	non	important	0,125 mg 0,25 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. *A administrer au cours des repas.*	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme buvable. Inapproprié selon la liste Priscus, de Beers 2012 (dose > à 0,125 mg/j) et de Laroche (dose > à 0,125 mg/j et ou concentration sérique > à 1,2 ng/ml). Les sujets âgés sont plus sensibles à la digoxine. La réduction de la fonction rénale peut entraîner une diminution de la clairance du produit et un risque de toxicité. Surveiller la digoxinémie, adapter les doses. Autres alternatives possible : béta-bloquants, diurétiques, IEC.	/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Digoxine[B L P]	DIGOXINE®	non	important	5 µg/0,1 ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 60ml)	A administrer directement dans la bouche à l'aide de la pipette-doseuse.	Tenir compte de la présence d'éthanol. *Conservation : 2 mois à t° ambiante après ouverture.* Inapproprié selon la liste Priscus, de Beers 2012 (dose > à 0,125 mg/j) et de Laroche (dose > à 0,125 mg/j et ou concentration sérique > à 1,2 ng/ml). Les sujets âgés sont plus sensibles à la digoxine. La réduction de la fonction rénale peut entraîner une diminution de la clairance du produit et un risque de toxicité. Surveiller la digoxinémie, adapter les doses. Autres alternatives possible : béta-bloquants, diurétiques, IEC.	/!\	/!\
Antiarythmiques									
Classe III									
Amiodarone[B]	CORDARONE®	oui	important	200 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la présence d'iode. Eviter l'exposition solaire. Inapproprié selon la liste de Beers : modification de l'intervalle QT et risque de torsades de pointe. Manque d'efficacité chez le sujet âgé.		

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Vasodilatateurs en cardiologie									
Dérivés nitrés									
Dérivés nitrés à action immédiate									
Isosorbide dinitrate	ISOCARD®	non	important	1%	Sol. sublinguale (fl. pulvérisateur 20 ml)	Voie sublinguale. Pulvériser sur la muqueuse buccale, sous la langue, sans inhaler. En cas de renouvellement, conseiller au patient de s'asseoir et de rester assis pendant une dizaine de minutes après la deuxième administration.			
Trinitrine	NATISPRAY®	non	important	0,15 mg 0,30 mg	Sol. pour pulvérisation buccale (fl. 13,5 et 18 ml)	Voie sublinguale. Pulvériser sur la muqueuse buccale, sous la langue, sans inhaler. En cas de renouvellement, conseiller au patient de s'asseoir et de rester assis pendant une dizaine de minutes après la deuxième administration.			

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Trinitrine	TRINITRINE SIMPLE®	non	important	0,15 mg	Pilule enrobée	Voie sublinguale. A croquer et à garder dans la bouche. En cas de renouvellement, conseiller au patient de s'asseoir et de rester assis pendant une dizaine de minutes après la deuxième administration.			
Dérivés nitrés à action prolongée									
Isosorbide mononitrate	MONICOR®	non	important	20 mg 40 mg 60 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ouverture possible de la gélule mais attention ne pas écraser les microgranules.* *A administrer immédiatement après ouverture.*	Respecter un intervalle libre d'au moins 12h entre deux prises.		

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Trinitrine	NITRIDERM TTS® DIAFUSOR® CORDIPATCH® DISCOTRINE® EPINITRIL® TRINIPATCH®	oui	important	5 mg/24h 10 mg/24h 15 mg/ 24h (pas de générique pour ce dosage)	Dispositif transdermique	A appliquer sur peau sèche et propre, non irritée, non écorchée. Ne pas couper les dispositifs. Ne recoller un dispositif au même endroit qu'après plusieurs jours.	Respecter un intervalle libre d'au moins 8h entre deux patchs.		
Autres vasodilatateurs en cardiologie									
Molsidomine	CORVASAL®	oui	important	2 mg 4 mg	Cp. sécable Comprimé	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage (principe actif photosensible).* *A administrer au cours des repas.*			/!\
Nicorandil	ADANCOR® IKOREL®	oui	important	10 mg 20 mg	Cp. sécable Comprimé	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.*			

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diurétiques									
Diurétiques du tube distal, thiazidiques									
Hydrochloro-thiazide	ESIDREX®	non	important	25 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. Goût désagréable, à administrer immédiatement après broyage, sur un aliment semi-solide. Ne pas dissoudre au préalable.*		/!\	/!\
Diurétiques du tube distal, non thiazidiques									
Ciclétanine	TENSTASTEN®	oui	important	50 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule.		/!\	/!\
Indapamide	FLUDEX®	oui	important	2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer, ni sucer. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer en suspension après broyage.*		/!\	/!\
Indapamide	FLUDEX®	oui	important	1,5 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diurétiques de l'anse									
Bumétanide	BURINEX®	non	important	1 mg 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ecrasement possible des comprimés. Administrer immédiatement après broyage (principe actif photosensible)* .		/!\	/!\
Furosémide	LASILIX®	oui	important	10 mg/ml	Sol. buvable (fl. 60 ml)	A avaler pur à l'aide de la pipette doseuse. Possibilité de diluer dans un demi verre d'eau.	Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 6 semaines après ouverture.	/!\	/!\
Furosémide	LASILIX FAIBLE® LASILIX® LASILIX SPECIAL®	non	important	20 mg 40 mg 500 mg	Comprimé Cp. sécable Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. Administrer immédiatement après broyage (principe actif photosensible).*	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.	/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Furosémide	LASILIX RETARD®	oui	important	60 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. A administrer à jeun. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ouverture possible des gélules. Ne pas écraser le contenu.*		/!\	/!\
Diurétiques épargneurs potassiques									
Spironolactone[B]	ALDACTONE®	oui	important / insuffisant	25 mg 50 mg 75 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. Goût très désagréable, mettre en suspension dans un liquide.*	Inapproprié selon la liste de Beers 2012 à une dose > à 25 mg/j. Dans l'IC, risque d'hyperkaliémie augmenté chez le sujet âgé notamment en cas de dose > à 25 mg/j ou association à un AINS, un IEC, un ARA II, une supplémentation en potassium. A éviter en cas d'IC ou de clairance de la créatinine < 30 ml/min.	/!\	/!\
Diurétiques et épargneurs potassiques en association									
Spironolactone + altizide	ALDACTAZINE®	oui	important	25 mg + 15 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *A administrer au cours ou en fin de repas.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Vasculoprotecteurs									
Médicaments pour traitement des hémorroïdes									
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate	TITANOREINE®	non	insuffisant	2 g/100 g + 2 g/100 g + 2,50 g/100 g	Crème rectale (tb. 40 g)	A administrer par voie rectale.			
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate	TITANOREINE®	non	insuffisant	0,40 g + 0,20 g + 0,30 g	Suppositoire	A administrer par voie rectale.			
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate + lidocaïne	TITANOREINE® à la lidocaïne	non	insuffisant	2 g/100 g + 2 g/100 g + 2,50 g/100 g + 2 g/100 g	Crème rectale (tb. 20 g)	A administrer par voie rectale.			
Bétabloquants									
Bétabloquants non cardiosélectifs									
Acébutolol	SECTRAL®	oui	important	200 mg 400 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.	/!\	

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Acébutolol	SECTRAL®	non	important	500 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.	/!\	
Acébutolol	SECTRAL®	non	important	40 mg/ml	Sol. buvable (fl. 125 ml)	A administrer par voie orale. Utiliser la seringue doseuse.	Tenir compte de la teneur en éthanol.	/!\	
Propranolol	AVLOCARDYL®	oui	important	40 mg	Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible d es comprimés.* *A administrer pendant les repas.*		/!\	/!\
Propranolol	AVLOCARDYL®	oui	important	160 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ouverture possible de la gélule. Ne pas écraser le contenu.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Sotalol[P]	SOTALEX®	oui	important	80 mg 160 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ecrasement possible des comprimés.*	Inapproprié selon la liste Priscus : béta-bloquant avec des effets antiarythmiques. Autres alternatives disponibles : béta-bloquants cardiosélectifs (ex: bisoprolol, métoprolol, carvédilol), amiodarone. Surveillance des fonctions cardiovasculaire, pulmonaire et ajustement à la fonction rénale. Il est recommandé de commencer à la demi-dose de la dose usuelle et d'augmenter progressivement.	/!\	
Bétabloquants cardiosélectifs									
Aténolol	TENORMINE®	oui	important	50 mg 100 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\
Bisoprolol	CARDENSIEL®	oui	important	1,25 mg 2,5 mg 3,75 mg 5 mg 7,5 mg	Cp. pelliculé sécable (sauf le 1,25 mg)	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ecrasement possible des comprimés. Goût amer. A administrer immédiatement après broyage.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Bisoprolol	CARDENSIEL® DETENSIEL®	oui	important	10 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ecrasement possible des comprimés. Goût amer. A administrer immédiatement après broyage.*		/!\	/!\
Céliprolol	CELECTOL®	oui	important	200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à jeun.		/!\	/!\
Métoprolol	SELOKEN® LOPRESSOR®	oui	important	100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés.*			/!\
Métoprolol	SELOKEN® LOPRESSOR®	non	important	200 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer la forme comprimé écrasable.		/!\
Nébivolol	TEMERIT® NEBILOX®	oui	important	5 mg	Cp. quadrisécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Alpha et bétabloquant									
Carvédilol	KREDEX®	oui	important	6,25 mg 12,5 mg 25 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe au cours d'un repas.		/!\	/!\
Inhibiteurs calciques									
Inhibiteurs calciques avec effets vasculaires prédominants									
Amlodipine	AMLOR®	oui	important	5 mg 10 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. *Ouverture possible des gélules, ne pas écraser le contenu.*			/!\
Lercanidipine	LERCAN® ZANIDIP®	oui	important	10 mg 20 mg	Cp. pelliculé sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe avant le repas.	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse.	/!\	/!\
Nicardipine[L]	LOXEN®	non	important	20 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer 30 minutes avant un repas.	Inapproprié selon la liste de Laroche : risque d'hypotension orthostatique, d'accident coronaire ou cérébral. Autres alternatives thérapeutiques disponibles : autres anti-hypertenseurs, sauf anti-hypertenseurs à action centrale.		

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Nicardipine[L]	LOXEN®	non	important	50 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer avant un repas.	Inapproprié selon la liste de Laroche : risque d'hypotension orthostatique, d'accident coronaire ou cérébral. Autres alternatives thérapeutiques disponibles : autres anti-hypertenseurs, sauf anti-hypertenseurs à action centrale.		
Inhibiteurs calciques avec effets cardiaques et vasculaires									
Diltiazem	MONO TILDIEM®	non	important	200 mg 300 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Ouverture possible des gélules. A administrer rapidement après ouverture, ne pas broyer les microgranules. A administrer au cours d'un repas.*		/!\	/!\
Diltiazem	TILDIEM®	oui	important	60 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au début d'un repas.		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Vérapamil	ISOPTINE®	oui	important	40 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés.*			/!\
Vérapamil	ISOPTINE®	oui	important	120 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ouverture possible des gélules.*			/!\
Vérapamil	ISOPTINE®	oui	important	240 mg	Cp. sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.	Si impossibilité d'avaler, préférer les comprimés ou gélules.		/!\
Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine									
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion non associés									
Enalapril	RENITEC®	oui	important	5 mg 20 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau.		/!\	/!\
Lisinopril	ZESTRIL®	oui	important	5mg 20 mg	Cp. sécable (20 mg non sécable)	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Périndopril	COVERSYL®	oui	important	2,5 mg (générique dosé à 2 mg) 5 mg (générique dosé à 4mg) 10mg (générique dosé à 8 mg)	Cp. pelliculé Cp. pelliculé sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe avant un repas. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\
Ramipril	TRIATEC®	oui	important	1,25 mg 2,5 mg 5 mg 10 mg	Comprimé Cp. sécable Cp. sécable Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.	Si impossibilité d'avaler, préférer les autres IEC pouvant être écrasés (périndopril, lisinopril).	/!\	/!\
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion associés									
Bénazépril + hydrochloro-thiazide	CIBADREX®	oui	important	10 mg + 12,50 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau.		/!\	/!\
Lisinopril + hydrochloro-thiazide	ZESTORETIC®	oui	important	20 mg + 12,50 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. *Ecrasement possible des comprimés. Goût désagréable.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Périndopril + indapamide	PRETERAX®	oui	important	2 mg + 0,625 mg 2,50 mg + 0,625 mg	Cp. sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant un repas. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\
Périndopril + indapamide	BIPRETERAX®	oui non non	important	4 mg + 1,25 mg 5 mg + 1,25 mg 10 mg + 2,50 mg	Comprimé Cp. pelliculé Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant un repas. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antagonistes de l'angiotensine II (ARA II)									
ARA II non associés									
Candésartan	ATACAND® KENZEN®	non	important	4 mg 8 mg 16 mg 32 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. *Ecrasement possible des comprimés.*		/!\	/!\
Irbésartan	APROVEL®	non	important	75 mg 150 mg 300 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.			/!\
Losartan	COZAAR®	oui	important	50 mg 100 mg	Cp. pelliculé sécable Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe. *A administrer avant le repas.*		/!\	/!\
Losartan	COZAAR®	non	important	2,5 mg/ml	Susp. buvable (poudre et solvant)	Agiter avant emploi. Utiliser la seringue pour l'administration. A administrer à heure fixe.	Conservation : 4 semaines entre 2°C et 8°C après reconstitution.	/!\	/!\
Valsartan	TAREG® NISIS®	oui	important	40 mg 80 mg 160 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.			/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Valsartan	TAREG®	non	important	3 mg/ml	Sol. buvable (fl 160 ml)	Utiliser la seringue pour prélever la solution. Prendre un verre d'eau après la prise. A administrer à heure fixe.	Conservation : 3 mois à t° ambiante après ouverture.		/!\
ARA II associés									
Valsartan + hydrochloro-thiazide	COTAREG® NISISCO®	oui	important	80 mg + 12,5 mg 160 mg + 12,5 mg 160 mg + 25 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.		/!\	/!\
Agents modifiant les lipides									
Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase									
Atorvastatine	TAHOR®	non	important	10 mg 20 mg	Cp. à croquer	A avaler entier avec de l'eau ou croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		/!\
Atorvastatine	TAHOR®	non	important	10 mg 20 mg 40 mg 80 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		/!\

Système cardiovasculaire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Pravastatine	VASTEN® ELISOR®	oui	important	10 mg 20 mg 40 mg	Cp. sécable (VASTEN® 40 mg non sécable)	A avaler avec de l'eau à distance des autres traitements. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Rosuvastatine	CRESTOR®	non	important	5 mg 10 mg 20 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer une autre statine (TAHOR®, VASTEN®, ELISOR®).*	/!\	/!\
Simvastatine	ZOCOR®	non	important	5 mg 20 mg	Cp. pelliculé Cp. sécable	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Déconseillé avec du jus de pamplemousse.	/!\	/!\
Simvastatine	LODALES® ZOCOR®	oui	important	20 mg 40 mg	Cp. enrobé Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Déconseillé avec du jus de pamplemousse.	/!\	/!\

D. Médicaments dermatologiques



Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antifongiques à usage dermatologique									
Antifongiques à usage topique									
Dérivés imidazolés et triazolés									
Bifonazole	AMYCOR®	non	modéré	1%	Crème (tb. 15 g)	A appliquer sur la peau propre et sèche. Utiliser en massage. Se laver les mains après utilisation.			
Bifonazole	AMYCOR®	non	modéré	1%	Poudre (fl. poudreur 15 g)	A appliquer sur la peau propre et sèche. Se laver les mains après utilisation.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Bifonazole	AMYCOR®	non	modéré	1%	Solution (fl. pulvérisateur 15 g)	A appliquer sur la peau propre et sèche. Se laver les mains après utilisation.			
Econazole	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Crème (tb. 30 g)	A appliquer sur la zone à traiter sur peau sèche. Utiliser en massage. Se laver les mains après application.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
Econazole	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Emulsion fluide (fl. 30 ml)	A agiter avant emploi.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
Econazole	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Poudre (fl. poudreur 30 g)	A appliquer sur la zone à traiter sur peau sèche. Se laver les mains après application.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Econazole	PEVARYL®	oui	modéré	1%	Solution (fl. pulvérisateur 30 g)	A agiter avant emploi. A appliquer sur la zone à traiter sur peau sèche, propre. Utiliser en massage. Se laver les mains après application.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
Kétoconazole	KETODERM®	non	modéré	2%	Crème (tb. 15 g)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		
Kétoconazole	KETODERM®	oui	modéré	2%	Gel (unidose, sach.)	Appliquer la totalité de la dose sur toute la surface du corps y compris le cuir chevelu, éventuellement à l'aide d'un gant humide. Faire mousser le gel, en insistant sur les zones atteintes. Laisser en place 5 minutes minimum. Rincer soigneusement. Ne pas avaler.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication du Candida).		

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres antifongiques									
Amorolfine	LOCERYL®	oui	modéré	5%	Vernis à ongles médicamenteux (fl. 2,5 ml)	Avant la première application de ce médicament, faire une toilette soigneuse des ongles, limer la zone atteinte de l'ongle, aussi complètement que possible. Nettoyer la surface de l'ongle et la dégraisser au moyen de dissolvant. Appliquer le vernis à l'aide d'une des spatules réutilisables sur la totalité de l'ongle atteint. Nettoyer la spatule réutilisable entre chaque passage d'un ongle à l'autre, afin d'éviter la contamination du vernis. Ne pas essuyer la spatule sur le bord du flacon.			
Ciclopirox olamine	MYCOSTER®	non	modéré	1%	Crème (tb. 30 g)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		
Ciclopirox olamine	MYCOSTER®	non	modéré	1%	Poudre (fl. poudreur 30 g)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Ciclopirox olamine	MYCOSTER®	non	modéré	1%	Solution (fl. 30 ml)	Voie cutanée.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		
Ciclopirox base	MYCOSTER®	oui	modéré	8%	Vernis à ongles médicamenteux (fl. 3 ml)	A appliquer sur tous les ongles infectés. Le vernis médicamenteux doit être appliqué sur l'ensemble du plateau unguéal. Bien refermer le flacon après chaque utilisation.	Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication de candida).		
Emollients et protecteurs									
Médicaments à base d'oxyde de zinc									
Oxyde de zinc	OXYPLASTINE®	non	insuffisant	46%	Pommade (tb. 135 g)	Voie cutanée.			
Oxyde de zinc + glycérol + talc	ALOPLASTINE®	non	faible	25% + 20% + 25%	Pâte (tb. 90, 200 g)	A appliquer en couche épaisse sur toute la zone à protéger.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Oxyde de zinc + huile de foie de poisson	MITOSYL®	non	insuffisant	20% + 27%	Pommade (tb. 20, 65, 150 g)	A appliquer sur la zone à traiter. Utiliser en massage.	Ne pas appliquer sous pansement occlusif. Ne pas utiliser avec ou après un antiseptique aux propriétés oxydantes (exemple : eau oxygénée).		
Paraffine et produits gras									
Cérat de Galien	CERAT DE GALIEN COOPER®					Voie cutanée. Etaler sur la zone à protéger.			
Glycérol + vaseline + paraffine liquide	DEXERYL®	non	faible / insuffisant	15% + 8% + 2%	Crème (tb. 50, 250 g)	A appliquer en couche mince.			
Vaseline	VASELINE® officinale, pure codex, stérilisée	non	non remboursé	100%	Pommade (tb. 20, 45, 60, 80 g)	Voie cutanée. Etaler sur la zone à protéger.			
Autres émollients et protecteurs									
Triéthanolamine	BIAFINE®	oui	insuffisant	0.67%	Emulsion (tb. 93,186 g)	A appliquer en couche épaisse sur la zone à traiter. Utiliser en massage.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments contre le psoriasis									
Médicaments à usage topique									
Calcipotriol	DAIVONEX®	non	important	50 µg/g	Crème (tb. 30, 120 g)	A appliquer sur la zone à traiter en couche mince. Se laver les mains après application.			
Calcipotriol + bétaméthasone	DAIVOBET®	non	important	50 µg/g + 0,5 mg/g	Gel (tb. 60 g)	Agiter avant emploi. A appliquer en couche mince, utiliser en massage. Ne pas rincer après application. Se laver les mains avant et après application.		/!\	/!\
Calcipotriol + bétaméthasone	DAIVOBET®	non	important	50 µg/g + 0,5 mg/g	Pommade (tb. 60 g)	Agiter avant emploi. A appliquer en couche mince, utiliser en massage. Ne pas rincer après application. Se laver les mains avant et après application.		/!\	/!\

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antibiotiques et chimiothérapies à usage dermatologique									
Antibiotiques à usage topique									
Acide fusidique	FUCIDINE®	oui	modéré	2%	Crème (tb. de 15 g)	Applications locales avec ou sans pansement après nettoyage de la surface infectée. Eviter l'application en couche épaisse. La forme crème est plus particulièrement adaptée aux lésions suintantes, macérées, et des plis.			
Acide fusidique	FUCIDINE®	oui	modéré	2%	Pommade (tb.15 g)	Applications locales avec ou sans pansement après nettoyage de la surface infectée. Eviter l'application en couche épaisse. Ne pas utiliser la forme pommade sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis, ni sur les ulcères de jambe.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Chimiothérapie à usage topique									
Antiviraux									
Aciclovir	ZOVIRAX®	oui	faible	5%	Crème (tb. 2 et 10 g)	Voie cutanée.	Ne pas utiliser en intrabuccal ou en intravaginal.		
Corticoïdes et préparations dermatologiques									
Corticoïdes d'activité modérée									
Désonide	TRIDESONIT®	non	important	0.05%	Crème (tb. 30 g)	Utiliser en massage.			
Désonide	LOCAPRED® LOCATOP®	non	important	0.10%	Crème (tb. 15, 30 g)	Utiliser en massage.			
Hydrocortisone	LOCOID®	non	important	0.10%	Crème épaisse (tb. 30 g) Crème (tb. 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Hydrocortisone	LOCOID®	non	important	0.10%	Pommade (tb. 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Hydrocortisone	LOCOID®	non	important	0.10%	Emulsion (fl. 30 ml)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Hydrocortisone	LOCOID®	non	important	0.10%	Lotion (fl. 30 ml)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Corticoïdes d'activité forte									
Bétaméthasone	DIPROSONE®	non	important	0.05%	Crème (tb. 30 g)	Utiliser en massage. Appliquer en touches espacées puis étaler jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone	DIPROSONE®	non	important	0.05%	Lotion (fl. 30 ml)	Utiliser en massage. Appliquer en touches espacées puis étaler jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone	DIPROSONE®	non	important	0.05%	Pommade (tb. 30 g)	Utiliser en massage. Appliquer en touches espacées puis étaler jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Bétaméthasone	BETNEVAL®	non	important	0.10%	Crème Pommade (tb. 10, 30, 100 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone	BETNEVAL®	non	important	0.10%	Emulsion (fl. 15 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone + acide salicylique	DIPROSALIC®	non	faible	0,5% + 2%	Lotion (fl. 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Bétaméthasone + acide salicylique	DIPROSALIC®	non	faible	0,05% + 3%	Pommade (tb. de 30 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Corticoïdes d'activité très forte									
Clobétasol	DERMOVAL®	oui	important	0.05%	Crème (tb. 10 g)	Voie cutanée. Appliquer en touches espacées puis étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce que la crème soit entièrement absorbée.			
Clobétasol	DERMOVAL®	non	important	0.05%	Gel (fl. 20 ml)	Le gel doit être appliqué en petites quantités directement sur le cuir chevelu, raie par raie. Se laver les mains après utilisation.			
Antiseptiques et désinfectants									
Produit iodé									
Povidone iodée	BETADINE® Alcoolique	non	important	5%	Solution (fl. 125, 500 ml, unidose 10 ml non remboursée)	A appliquer sur la surface de la peau avec une compresse stérile. Laisser sécher avant l'acte de petite chirurgie.		/!\	
Povidone iodée	BETADINE® Dermique	oui	important / faible	10%	Solution (unidose 5 et 10 ml non remboursée et pas de générique, fl. 125 et 500 ml)	Voie cutanée. A utiliser pure (badigeonnage sur la peau) ou diluée (au 1/10 avec de l'eau ou du sérum physiologique stérile pour le lavage des plaies et à 2 % dans le sérum physiologique stérile pour les irrigations des plaies.		/!\	

Médicaments dermatologiques	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Povidone iodée	BETADINE® Scrub	non	faible / important / modéré	4%	Solution (unidose 10 ml, fl. 125 ml)	A utiliser pure ou diluée. Rincer après application.		/!\	
Biguanides et amidines									
Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium + alcool benzylique	BISEPTINE®	non	faible / important	250 mg/ 100 ml 25 mg/ 100 ml 4 ml/100 ml	Solution (fl. 100, 250 ml)	Usage cutané strict. Solution prête à l'emploi.	Eviter l'emploi successif avec les savons.	/!\	
Autre									
Hypochlorite de sodium	DAKIN®	non	modéré	0,5 g/100 ml (exprimé en chlore actif)	Solution (fl. 60, 125, 250, 500 ml)	Ne pas diluer. A appliquer en lavages, bains locaux, en irrigations, en compresses imbibées ou pansements humides.			

G. Système génito-urinaire et hormones sexuelles



Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique									
Dérivés imidazolés									
Econazole	GYNO PEVARYL®	non	modéré	150 mg	Ovule	Rester allongée pendant l'administration.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication des candida).		
Econazole	GYNO PEVARYL®	oui	modéré	150 mg	Ovule à libération prolongée	Rester allongée pendant l'administration.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (favorise la multiplication des candida).		

Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Métronidazole	FLAGYL®	non	modéré	500 mg	Ovule	Rester allongée pendant l'administration.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		
Autres									
Povidone iodée	BETADINE®	non	insuffisant	250 mg	Ovule			/!\	
Povidone iodée	BETADINE®	non	insuffisant	10%	Solution vaginale (fl. 125 et 500 ml)	A utiliser pure (badigeonnages internes ou externes) ou diluée avec un nécessaire à injections vaginales (2 cuillères à soupe par litre d'eau tiède).		/!\	
Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale									
Estrogènes									
Promestriène	COLPOTRO-PHINE®	non	modéré	1%	Crème vaginale (tb. 30g)	Application vulvaire en couche mince.			
Promestriène	COLPOTRO-PHINE®	non	modéré	10 mg	Capsule vaginale				

Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-androgènes									
Cyprotérone	ANDROCUR®	oui	important	50 mg 100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*			/!\
Médicaments urologiques									
Antispasmodiques urinaires									
Trospium	CERIS®	non	modéré	20 mg	Cp. enrobé	A avaler avec un grand verre d'eau (goût très amer). Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à jeun avant les repas.		/!\	/!\
Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate									
Alphabloquants									
Alfuzosine	XATRAL®	oui	modéré	2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	/!\
Alfuzosine	XATRAL®	oui	modéré	10 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer après un repas.		/!\	/!\

Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Tamsulosine	MECIR®	oui	modéré	0,4 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.		/!\	/!\
Tamsulosine	JOSIR® OMIX®	oui	modéré	0,4 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. A administrer à heure fixe, à la fin d'un repas. *Possibilité d'ouvrir les gélules mais ne pas écraser les microgranules. Mise en suspension des granules possible mais doit se faire juste avant l'administration. Il est possible de les administrer par une sonde nasogastrique selon le même procédé.*		/!\	/!\
Inhibiteurs de la 5-alpha testostérone réductase									
Dutastéride	AVODART®	non	modéré	0,5 mg	Capsule molle	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la capsule. Ne pas écraser, ne pas croquer.			/!\

Système génito-urinaire et hormones sexuelles	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres									
Serenoa repens	PERMIXON®	non	modéré	160 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas.			

H. Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues

Hormones sytémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Corticoïdes à usage systémique									
Glucocorticoïdes									
Bétaméthasone	CELESTENE®	oui	important	2 mg	Cp. dispersible sécable	A avaler avec de l'eau ou après dissolution dans de l'eau. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\
Bétaméthasone	CELESTENE®	oui	important	0.05%	Sol. buvable en gouttes (fl. 30 ml)	A avaler après avoir mis les gouttes dans un verre d'eau. A administrer de préférence à la fin du repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Conservation : 8 semaines à t° ambiante après ouverture.	/!\	/!\

Hormones sytémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Hydrocortisone	HYDRO-CORTISONE®	non	important	10 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Possibilité d'écraser les comprimés et de les mélanger à un aliment.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Méthylpredni-solone	MEDROL®	non	important	4 mg 16 mg 100 mg	Cp. sécable Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours du repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Prednisone	CORTANCYL®	oui	important	1 mg 5 mg 20 mg	Comprimé Cp. sécable Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage car le principe actif est sensible à la lumière.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Si impossibilité d'avaler, préférer le comprimé orodispersible (SOLUPRED®).	/!\	/!\
Prednisolone	SOLUPRED®	oui	important	5 mg 20 mg	Cp. orodispersible	Laisser fondre dans la bouche puis boire de l'eau. Ne pas croquer (risque d'amertume). A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Prednisolone	SOLUPRED®	oui	important	5 mg 20 mg	Cp. effervescent	Avaler après dissolution dans de l'eau. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!\	/!\

Hormones sytémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Prednisolone	SOLUPRED®	non	important	1 mg/ml	Sol. buvable (fl. 50 ml)	A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 1 mois à t° ambiante après ouverture.	/!\	/!\
Médicaments de la thyroïde									
Hormones thyroïdinennes									
Lévothyroxine	LEVOTHYROX®	oui	important	25 µg 50 µg 75 µg 100 µg 125 µg 150 µg 175 µg 200 µg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer à jeun. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement après broyage.*	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.*		
Lévothyroxine	L THYROXINE SERB®	non	important	0,15 mg/ml	Sol. buvable en gouttes (fl. 15 ml)	Utiliser le compte-goutte. A administrer à jeun.	Contrôler l'INR en cas d'association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. *Conservation : 1 mois après ouverture au réfrigérateur.*		
Antithyroïdiens									
Carbimazole	NEO-MERCAZOLE®	non	important	5 mg 20 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés. Peu soluble dans l'eau.*			/!\

Hormones sytémiques, hormones sexuelles exclues	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Hormones pancréatiques									
Hormones glycogénolytiques									
Glucagon	GLUCAGEN®	non	important	1 mg/1 ml	Sol. injectable (poudre et solvant, kit : seringue préremplie)	A administrer par voie SC, IM ou IV.	Conservation : entre 2°C et 8°C ou à t°ambiante pendant 18 mois. Utiliser immédiatement après reconstitution.		

J. Anti-infectieux généraux à usage systémique



Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antibactériens à usage systémique									
Tétracyclines									
Doxycycline	VIBRAMYCINE N®	oui	important / insuffisant	100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau ou après dissolution dans de l'eau en agitant bien après dispersion des comprimés (la couleur jaune est normale). Ne pas avaler en position couchée. Ne pas s'allonger pendant l'heure suivant la prise. A administrer au cours d'un repas et au mois 1 heure avant le coucher. *Ne pas administrer en même temps qu'un produit lacté.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Bétalactamines									
Amoxicilline	CLAMOXYL®	oui	important / insuffisant	500 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours ou en dehors d'un repas. *Ne pas administrer en même temps qu'un produit lacté.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. *Si impossibilité d'avaler, préférer CLAMOXYL® poudre pour solution buvable.*	/!\	
Amoxicilline	CLAMOXYL® (sans sucre)	oui	important / insuffisant	1 g	Cp. dispersible	A avaler avec de l'eau ou après dispersion dans de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler préférer CLAMOXYL® poudre pour solution buvable.*	/!\	
Amoxicilline	CLAMOXYL®	oui	important / insuffisant	125 mg/5 ml 250 mg/5 ml 500 mg/5 ml	Sol. buvable (poudre en fl. 60 ml)	Remplir le flacon avec de l'eau non gazeuse. A agiter avant emploi. Utiliser la cuillère-mesure.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir en compte de la teneur en sodium. *Conservation : 14 jours à t° ambiante après reconstitution.*	/!\	
Amoxicilline + acide clavulanique	AUGMENTIN®	oui	important / insuffisant	500 mg + 62,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au début d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en potassium.	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Amoxicilline + acide clavulanique	AUGMENTIN®	oui	important / insuffisant	1 g + 125 mg	Susp. buvable (poudre en sach.)	A avaler après dissolution dans de l'eau. A administrer au début d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en potassium. *Conservation : 7 jours entre 2 et 8°C après reconstitution.*	/!\	/!\
Cloxacilline	ORBENINE®	non	important / insuffisant	500 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer 30 minutes avant les repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!\	/!\
Céphalosporines									
Céfixime	OROKEN®	oui	important / insuffisant	200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable (forme pédiatrique).	/!\	
Cefpodoxime	ORELOX®	oui	important / insuffisant	100 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas (*goût désagréable*).	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable (forme pédiatrique).	/!\	
Ceftriaxone	ROCEPHINE®	oui	important	0,5 g/2 ml 1 g/3,5 ml	Sol. injectable (poudre et solvant)	A administrer par voie IM (injecter dans la face antérolatérale de la cuisse) ou administrer par voie SC. Ne pas injecter en IV.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Ceftriaxone	ROCEPHINE®	oui	important	0,5 g/5 ml 1 g/10 ml	Sol. injectable (poudre et solvant)	A administrer par voie IV (directe, lente, ou en perfusion) et SC (après dilution dans de l'eau pour préparation injectable ou sérum).	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!\	/!\
Céfuroxime	ZINNAT®	oui	important / insuffisant	125 mg 250 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. *Si impossibilité d'avaler, préférer ZINNAT® 125 mg suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\
Sulfamides et triméthoprime									
Sulfaméthoxazole + triméthoprime	BACTRIM®	non	important	400 mg + 80 mg	Comprimé	A administrer au cours ou à la fin d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\
Sulfaméthoxazole + triméthoprime	BACTRIM FORTE®	oui	important	800 mg + 160 mg	Comprimé	A administrer au cours ou à la fin d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Macrolides									
Azithromycine	ZITHROMAX® ZITHROMAX® monodose	oui	important / insuffisant	250 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\
Azithromycine	ORDIPHA®	non	important / insuffisant	500 mg	Cp. dispersible sécable	Disperser le comprimé ou le demi-comprimé dans un verre d'eau avant la prise.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Azithromycine	AZADOSE®	non	important / insuffisant	600 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer de préférence avant un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\
Clarithromycine	ZECLAR®	oui	important / insuffisant	250 mg 500 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Clarithromycine	MONOZECLAR® MONONAXY®	oui	important / insuffisant	500 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*	/!\	/!\
Roxithromycine	RULID®	oui	important / insuffisant	100 mg 150 mg	Cp. pelliculé Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer avant un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer les comprimés sécables pour suspension buvable (forme pédiatrique) ou les autres macrolides en solution buvable (ZECLAR®, ZITHROMAX®).*		
Spiramycine	ROVAMYCINE®	non oui	important / insuffisant	1,5 MUI 3 MUI	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Si impossibilité d'avaler, préférer les autres macrolides en solution buvable (ZECLAR®, ZITHROMAX®).		
Streptogramines									
Pristinamycine	PYOSTACINE®	non	important	250 mg 500 mg	Cp. pelliculé Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Possibilité d'écraser le comprimé et de le mélanger avec un aliment (lait, confiture). A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Fluoroquinolones									
Ciprofloxacine	CIFLOX®	oui	important	250 mg 500 mg 750 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Eviter la prise simultanée de lait et d'aliments riches en calcium. *Ecrasement possible des comprimés. Peut être administré chez les patients par sonde nasogastrique après broyage.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	
Ciprofloxacine	UNIFLOX®	non	important	500 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer de préférence à jeun. Ne pas écraser, ne pas croquer. Ne doit pas être pris avec des produits laitiers ou des jus de fruits enrichis en minéraux.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	
Ciprofloxacine	CIFLOX®	non	important	500 mg/5 ml	Susp. buvable (Granulés et solvant)	Reconstituer à l'aide du solvant. Ne pas diluer dans de l'eau. Agiter avant emploi. Eviter la prise simultanée de lait et d'aliments riches en calcium.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Conservation : 14 jours entre 2°C - 8°C ou à t° ambiante après reconstitution.	/!\	

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Lévofloxacine	TAVANIC®	oui	important	500 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer immédiatement car principe actif sensible à la lumière.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	
Norfloxacine	NOROXINE®	oui	important	400 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Eviter la prise simultanée de produits laitiers.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK *Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable CIFLOX®.*	/!\	
Ofloxacine	OFLOCET®	oui	important / insuffisant	200 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. *Possibilité d'écraser les comprimés et de les dissoudre dans du jus de pomme. A administrer immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à l'humidité.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	
Ofloxacine	MONOFLOCET®	non	important	200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).	/!\	

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres									
Acide fusidique	FUCIDINE®	non	important	250 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés mais principe actif amer, il faut donc le mélanger avec un liquide sucré. A administrer immédiatement après broyage. Ne pas mélanger à du lait.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable (forme pédiatrique).*		/!\
Métronidazole	FLAGYL®	non	important	250 mg 500 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	Risque d'effet antabuse. Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable.*		/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Métronidazole	FLAGYL®	non	important	4%	Susp. buvable (fl. 120 ml)	A administrer par voie orale.	Risque d'effet antabuse. Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. *Conservation : 2 mois à t° ambiante après ouverture.*		/!\
Nitrofurantoïne B L P	FURADOINE®	non	important	50 mg	Comprimé	A administrer au cours d'un repas.	Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche et Priscus : rapport bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable. Risque d'IR, d'atteinte hépatique, de pneumopathie, de neuropathie périphérique, de réaction allergique. Alternatives: - thérapeutique : antibiotique à élimination rénale et adapté à l'antibiogramme. - non thérapeutique : augmenter les apports hydriques. Surveillance des fonctions rénale, hépatique et pulmonaire.	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Nitrofurantoïne B L P	FURADANTINE®	non	important	50 mg	Gélule	A administrer au cours d'un repas. *Ouverture possible des gélules.* *A administrer immédiatement après ouverture.*	Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche et Priscus : rapport bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable. Risque d'IR, d'atteinte hépatique, de pneumopathie, de neuropathie périphérique, de réaction allergique. Alternatives: - thérapeutique : antibiotique à élimination rénale et adapté à l'antibiogramme. - non thérapeutique : augmenter les apports hydriques. Surveillance des fonctions rénale, hépatique et pulmonaire.	/!\	/!\
Antimycosiques à usage systémique									
Amphotéricine B	FUNGIZONE®	non	important	10%	Susp. buvable (fl. 40 ml)	A administrer par voie orale.	Tenir compte de la teneur en éthanol et en potassium. *Conservation : 10 jours à t° ambiante avec ouverture quotidienne.*	/!\	/!\
Fluconazole	TRIFLUCAN®	oui	important	50 mg 100 mg 200 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. *Ouverture possible des gélules.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler préférer la forme buvable.*	/!\	/!\

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Fluconazole	TRIFLUCAN®	oui non	important	50 mg/5 ml 200 mg/5 ml	Susp. buvable (poudre en fl. 24,4 g)	Reconstituer avec de l'eau. Agiter avant emploi. Utiliser la cuillère mesure.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Conservation : 2 semaines à t° ambiante après ouverture.*	/!\	/!\
Antiviraux à usage systémique									
Aciclovir	ZOVIRAX®	oui	important	200 mg 800 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau.	Si impossibilité d'avaler, préférer la suspension buvable.	/!\	/!\
Aciclovir	ZOVIRAX®	oui	important	200 mg/5 ml 800 mg/10 ml	Susp. buvable (fl. 125 et 180 ml)	Utiliser le gobelet doseur pour prélever.	Conservation : 2 mois à t° ambiante après ouverture.	/!\	/!\
Oseltamivir	TAMIFLU®	non	insuffisant / faible	30 mg 45 mg 75 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule, mélanger le contenu avec au maximum une cuillère à café d'un aliment sucré approprié (principe actif à goût amer). La préparation doit être mélangée et administrée immédiatement au patient dans sa totalité.		/!\	

Anti-infectieux généraux à usage systémique	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Oseltamivir	TAMIFLU®	non	insuffisant / faible	12 mg/ml	Poudre orale (fl. 30 g)	Utiliser la seringue pour l'administration.	Conservation : 10 jours entre 2 et 8°C après ouverture.	/!\	
Valaciclovir	ZELITREX®	oui	important	500 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.	*Si impossibilité d'avaler, préférer ZOVIRAX® en solution buvable .*	/!\	

L. Antinéoplasiques et immunomodulateurs

Antinéoplasiques et immunomodulateurs	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Thérapeutiques endocrines									
Hormones et apparentés									
Analogues de l'hormone entraînant la libération de gonadotrophines									
Leuproréline	ENANTONE®	non	important	3,75 mg 11,25 mg 30 mg	Susp. injectable à libération prolongée (poudre et solvant)	A administrer par voie SC ou IM. Ne pas injecter en IV, en intra-artériel. Dosage 30 mg réservé à la voie SC.			
Antihormones et apparentés									
Anti-estrogènes									
Tamoxifène	NOLVADEX®	oui	important	10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. *Possibilité d'écraser les comprimés. A administrer immédiatement après broyage (principe actif sensible à la lumière).*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Protection nécessaire pour les cytotoxiques, manipulation interdite chez la femme enceinte en cas de broyage.*		

Antinéoplasiques et immunomodulateurs	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Tamoxifène	NOLVADEX®	oui	important	20 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau.			
Antiandrogènes									
Bicalutamide	CASODEX®	oui	important	50 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.			/!\
Inhibiteurs enzymatiques									
Anastrozole	ARIMIDEX®	oui	important	1 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe.		/!\	/!\
Létrozole	FEMARA®	oui	important	2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau.		/!\	/!\

M. Muscle et squelette



Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Topiques pour douleurs articulaire et musculaire									
Anti-inflammatoires non stéroïdiens à usage topique									
Diclofénac	VOLTARENE® Emulgel	oui	Modéré / Faible	1%	Gel (fl. 100 ml, tb. 50 g)	En massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Se laver les mains après utilisation.			
Diclofénac	FLECTOR®	oui	Modéré / Faible	1%	Gel (fl. 100 g, tb. 60 g)	En massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Se laver les mains après utilisation			

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux									
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens									
Diclofénac [B]	VOLTARENE®	oui	important	25 mg 50 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas sucer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.	/!\	/!\

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diclofénac [B]	VOLTARENE®	non	important	75 mg 100 mg	Cp. enrobé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer, ne pas sucer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.	/!\	/!\

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Diclofénac [B]	VOLTARENE®	oui	important	100 mg	Suppositoire	A administrer par voie rectale	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.	/!\	/!\

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Ibuprofène [B]	ADVIL®	oui	important	100 mg 200 mg 400 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas sucer. A administrer au cours d'un repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque d'hémorragies gastro-intestinales et d'ulcères chez les patients à haut risque tel que les sujets âgés de plus de 75 ans et/ou en cas d'association avec des corticoïdes, des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires. Il est conseillé de prendre un IPP ou du misoprostol mais ce risque n'est pas diminué. La prise chronique est à éviter à moins que les autres alternatives ne soient pas efficaces.	/!\	/!\
Antigoutteux									
Inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique									
Allopurinol	ZYLORIC®	oui	important	100 mg 200 mg 300 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer après les repas. *Écrasement possible des comprimés. Broyer peu de temps avant administration, ne pas conserver plus de 24h.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments sans effet sur le métabolisme de l'acide urique									
Colchicine + tiémonium [L] + opium	COLCHIMAX®	non	important	1 mg + 50 mg + 12,5 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Le tiémonium, destiné à limiter l'apparition de phénomènes diarrhéiques provoqués par la colchicine, est un antispasmodique inapproprié selon la liste de Laroche. Il n' aurait pas d'efficacité clairement démontrée, et présente des effets indésirables anticholinergiqes.	/!\	/!\
Médicaments pour le traitement des désordres osseux									
Médicaments agissant sur la structure osseuse et sur la minéralisation									
Biphosphonates									
Acide alendronique	FOSAMAX®	oui	important	10 mg 70 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. A administrer 30 minutes avant un repas.		/!\	

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Acide clodronique	CLASTOBAN®	non	important	800 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. A administrer 30 minutes avant un repas. *Possibilité de laisser fondre dans un verre d'eau plutôt que d'écraser les comprimés.*		/!\	
Acide risédronique	ACTONEL®	oui non oui oui	important	5 mg 30 mg 35 mg 75 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. A administrer 30 minutes avant un repas. *Ecrasement possible des comprimés exclusivement lors de l'administration par sonde.*		/!\	

Muscle et squelette	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Biphosphonates en association									
Acide alendronique + colécalciférol	FOSAVANCE®	oui	important	70mg + 70µg et 70mg + 140µg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer, ne pas laisser fondre dans la bouche, ne pas sucer. A avaler en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans les 30 minutes après administration. Eviter la prise simultanée de lait et d'aliments riches en calcium. A administrer 30 minutes avant un repas.		/!\	

N. Système nerveux



Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anesthésiques									
Anesthésiques locaux									
Amides									
Lidocaïne	XYLOCAINE®	non	important	2%	Gel urétral (seringue 10 g)	Usage urétral strict. Ne pas injecter. Introduire doucement l'extrémité de la seringue dans le méat jusqu'à étanchéité après avoir suivi les instructions concernant la manipulation de la seringue.			

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Lidocaïne	XYLOCAINE® visqueuse	non	important	2%	Gel oral (tb. 100 g)	Dans l'indication "douleurs œso-gastriques" : Absorber tel quel, puis avaler de suite un verre d'eau. Dans "l'indication explorations instrumentales" : Répartir le produit avec la langue.			/!\
Lidocaïne + prilocaïne	EMLA®	oui	important	5%	Crème (tb. 5 g, 30 g)	A appliquer au moins 1 h avant l'intervention sur la peau puis recouvrir d'un pansement. Si application sur muqueuse: pansement non nécessaire. Ne pas appliquer sur l'oeil ou à proximité des yeux. Ne pas appliquer dans le conduit auditif externe si le tympan est lésé.			
Lidocaïne + prilocaïne	EMLAPATCH®	non	important	5%	Pansement adhésif cutané	A appliquer au moins 1 h avant l'intervention. Retirer le résidu avec une compresse à la fin de la durée d'application. Ne pas appliquer sur l'oeil ou à proximité des yeux. Ne pas appliquer dans le conduit auditif externe si le tympan est lésé.			

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Analgésiques									
Opioïdes									
Alcaloïdes naturels de l'opium									
Morphine chlorhydrate	MORPHINE (Chlorhydrate) AGUETTANT®	oui	important	10 mg/ml	Sol. injectable (amp. 1, 5, 10 ml)	A administrer en IV, SC, intra-rachidien, péridural, intraventriculaire. Ne pas administrer en IM.		/!\	/!\
Morphine chlorhydrate	MORPHINE (Chlorhydrate) AGUETTANT®	oui	important	20 mg/ml	Sol. injectable (amp. 1, 10 ml)	A administrer en IV, SC, intra-rachidien, péridural, intraventriculaire. Ne pas administrer en IM.		/!\	/!\
Morphine chlorhydrate	MORPHINE (Chlorhydrate) AGUETTANT®	oui	important	40 mg/ml	Sol. injectable (amp. 10 ml)	A administrer en IV, SC, intra-rachidien, péridural, intraventriculaire. Ne pas administrer en IM.		/!\	/!\
Morphine sulfate	ACTISKENAN®	non	important	5 mg 10 mg 20 mg 30 mg	Gélule à libération immédiate	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule. Mélanger avec un aliment ou administrer avec une sonde gastrique. *Ne pas écraser les granules.*		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Morphine sulfate	SEVREDOL®	non	important	10 mg 20 mg	Cp. pelliculé sécable à libération immédiate	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	/!\
Morphine sulfate	ORAMORPH®	non	important	10 mg/5ml 20 mg/5ml 30 mg/5ml 100mg/5ml	Sol. buvable à libération immédiate (unidose 5 ml)	Utiliser pur ou mélangé avec un aliment. Administration possible par sonde gastrique ou nasogastrique.	Conservation : 2 mois après ouverture.	/!\	/!\
Morphine sulfate	SKENAN LP®	non	important	10 mg 30 mg 60 mg 100 mg 200 mg	Gélule à libération prolongée (microgranules)	A avaler avec de l'eau. Ouverture possible de la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer les microgranules. Mélanger le contenu avec les aliments. Possibilité d'administrer les microgranules par sonde nasogastrique.		/!\	/!\
Morphine sulfate	MOSCONTIN LP®	non	important	10 mg 30 mg 60 mg 100 mg 200 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	/!\
Codéine + paracétamol	CODOLIPRANE®	oui	important	400 mg + 20 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Codéine + paracétamol	DAFALGAN CODEINE®	non	important	500 mg + 30 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Codéine + paracétamol	DAFALGAN CODEINE®	oui	important	500 + 30 mg	Cp. effervescent sécable	A dissoudre dans un peu de liquide avant administration.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en sodium.	/!\	/!\
Autres opioïdes									
Tramadol + paracétamol	IXPRIM® ZALDIAR®	oui	important	37,5 mg + 325 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Tramadol + paracétamol	IXPRIM® ZALDIAR®	oui	important	37,5 mg + 325 mg	Cp. effervescent	A avaler après dissolution complète dans de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de l'apport en sodium.	/!\	/!\
Dérivés de la diphénylpipéridine									
Fentanyl	DUROGESIC®	oui	important	12 µg/h 25 µg/h 50 µg/h 75 µg/h 100 µg/h	Dispositif transdermique	Appliquer sur une peau non irritée, non écorchée, propre et sèche. Changer de site à chaque application : le tronc, les bras, le haut du dos. Ne pas découper le dispositif.		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres analgésiques et antipyrétiques									
Anilides									
Paracétamol	DOLIPRANE®	non	important	500 mg 1 g	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Paracétamol	DAFALGAN®	non	important	500 mg	Gélule	A avaler de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.	/!\	/!\
Paracétamol	EFFERALGAN®	non	important	500 mg 1 g	Cp. effervescent sécable	Dissoudre dans de l'eau. Boire après dissolution complète.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de l'apport en sodium.	/!\	/!\
Autres									
Néfopam	ACUPAN®	oui	important	20 mg/2 ml	Sol. injectable (amp. 2 ml)	A administrer en IM profonde ou en IV lente sur plus de 15 minutes, le patient étant allongé.		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Antiépileptiques									
Dérivés de la carboxamide									
Carbamazépine[B]	TEGRETOL®	oui	important	200 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Surveiller les taux plasmatiques. Précaution d'emploi : peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou d'hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.		

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Carbamazépine[B]	TEGRETOL®	oui	important	200 mg 400 mg	Cp. pelliculé sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Surveiller les taux plasmatiques. Précaution d'emploi : peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou d'hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.		
Carbamazépine[B]	TEGRETOL®	non	important	20 mg/ml	Susp. buvable (fl. 150 ml)	A avaler avec un peu d'eau. Utiliser la seringue graduée en millilitres pour prélever la dose correcte.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Surveiller les taux plasmatiques. Précaution d'emploi : peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou d'hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.		

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Dérivés d'acide gras									
Acide valproïque	DEPAKINE®	oui	important	200 mg 500 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		/!\	
Acide valproïque	DEPAKINE® Chrono	oui	important	500 mg	Cp. pelliculé sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		/!\	
Acide valproïque	DEPAKINE®	oui	important	200 mg/ml	Sol. buvable (fl. 40 ml)	Utiliser uniquement avec la seringue présente dans la boîte pour prélever . La solution sera absorbée après dilution dans un peu de boisson. A administrer de préférence au cours des repas.	Conservation : 1 mois après ouverture.	/!\	
Acide valproïque	DEPAKINE®	non	important	57,64 mg/ml	Sirop (fl. 150 ml)	Prélever uniquement à l'aide de la seringue présente dans la boîte. A administrer de préférence au cours des repas.	Tenir compte de la teneur en sodium. Conservation : 1 mois après ouverture.	/!\	
Acide valproïque	DEPAKOTE®	non	important	250 mg 500 mg	Cp. gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		/!\	

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Valpromide	DEPAMIDE®	non	important	300 mg	Cp. pelliculé gastro-résistant	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer de préférence au cours des repas.		/!\	
Autres antiépileptiques									
Gabapentine	NEURONTIN®	oui	important	100 mg 300 mg 400 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	
Gabapentine	NEURONTIN®	oui	important	600 mg 800 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.		/!\	
Lamotrigine	LAMICTAL®	oui	important	2 mg 5 mg 25 mg 50 mg 100 mg 200 mg	Cp. dispersible ou à croquer	A avaler avec de l'eau. Dissoudre dans de l'eau ou mâcher le comprimé. *A administrer toujours à la même heure, pendant le repas.*		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Prégabaline	LYRICA®	non	important	25 mg 50 mg 75 mg 100 mg 150 mg 200 mg 300 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser, ne pas croquer. *Overture possible de la gélule.*		/!\	
Antiparkinsoniens									
Dopaminergiques									
Dopa et dérivés									
Lévodopa + bensérazide	MODOPAR®	oui	important	200 mg + 50 mg 50 mg + 12,5 mg 100 mg + 25 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir ni croquer la gélule. A administrer au moins 30 minutes avant le repas.			
Lévodopa + bensérazide	MODOPAR®	non	important	100 mg + 25 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir ni croquer la gélule. A administrer au moins 30 minutes avant le repas.			

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Lévodopa + bensérazide	MODOPAR®	non	important	100 mg + 25 mg	Cp. sécable pour susp. buvable	Dissoudre dans de l'eau afin d'obtenir une suspension laiteuse. Remuer avant d'administrer dans la demi-heure. A administrer au moins 30 minutes avant le repas.			
Lévodopa + carbidopa	SINEMET®	oui	important	100 mg + 10 mg 250 mg + 5 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au début des repas.			
Lévodopa + carbidopa	SINEMET®	oui	important	100 mg + 25 mg 200 mg + 50 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au début des repas.			

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Lévodopa + carbidopa + entacapone	STALEVO®	non	important	50+12,5+200 mg 75+18,75+200 mg 100+25+200 mg 125+31,25+200 mg 150+37,5+200 mg 200+50+200 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas fractionner le comprimé. *Ecrasement possible des comprimés. Risque de perdre de la poudre. Administration immédiate sur un aliment semi-solide (ne pas dissoudre au préalable).*		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Agonistes dopaminergiques									
Piribédil [L]	TRIVASTAL®	non	insuffisant	20 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer. A administrer en fin de repas. *Ecrasement possible des comprimés.*	Inapproprié selon la liste de Laroche : pas d'efficacité clairement démontrée, risque d'hypotension orthostatique et de chutes chez les sujets âgés. alternative thérapeutique : abstention thérapeutique.		
Piribédil [L]	TRIVASTAL®	non	insuffisant	50 mg	Cp. enrobé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer en fin de repas.	Inapproprié selon la liste de Laroche : pas d'efficacité clairement démontrée, risque d'hypotension orthostatique et de chutes chez les sujets âgés. alternative thérapeutique : abstention thérapeutique.		

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Piribédil [L]	TRIVASTAL®	non	insuffisant	3 mg/ml	Sol. injectable (amp. 1 ml)	A administrer par voie IM ou IV lente.	Inapproprié selon la liste de Laroche : pas d'efficacité clairement démontrée, risque d'hypotension orthostatique et de chutes chez les sujets âgés. alternative thérapeutique : abstention thérapeutique.		
Pramipéxole	SIFROL®	non	important	0,18 mg 0,7 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau.		/!\	
Pramipéxole	SIFROL®	non	important	0,26 mg 0,52 mg 1,05 mg 2,1 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer à heure fixe.		/!\	

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Ropinirole	REQUIP®	oui	important	0,25 mg 0,5 mg 1 mg 2,5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours des repas. *Ecrasement possible des comprimés. Administration immédiate.*		/!\	/!\
Ropinirole	REQUIP®	oui	important	2 mg 4 mg 8 mg	Cp. pelliculé à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. A administrer à heure fixe au cours d'un repas.		/!\	/!\
Autres dopaminergiques									
Entacapone	COMTAN®	non	important	200 mg	Cp. pelliculé	A prendre avec ou sans aliments.		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Psycholeptiques									
Antipsychotiques									
Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines									
Clozapine B P	LEPONEX®	oui	important	25 mg 100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés et administrer de préférence dans l'alimentation.*	Surveillance stricte de la formule sanguine. Compléter le carnet de suivi prévu pour le traitement. Inapproprié selon la liste de Beers 2012 et Priscus : risque élevé d'agranulocytose et de myocardite. Effets anticholinergiques et légers effets extrapyramidaux, parkinsonisme, hypotonie, sédation, risque de chute, augmentation de la mortalité chez les patients déments. Alternative thérapeutique : neuroleptique atypique avec une balance bénéfice/risque favorable (ex : rispéridone). Surveillance des effets indésirables anticholinergiques ou extrapyramidaux, des fonctions neurologique et cognitive, cardiovasculaire et en cas d'antécédent de chute. Mesure de la tension artérielle.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Loxapine [B]	LOXAPAC®	non	important	25 mg 50 mg 100 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Inappropriée selon la liste de Beers 2012. Risque augmenté d'accident vasculaire cérébral et de mortalité chez les déments.	/!\	/!\
Loxapine [B]	LOXAPAC®	non	important	25 mg/goutte	Sol. buvable (fl. 30, 60 ml)	Utiliser la seringue pour l'administration.	*Conservation : 4 semaines après ouverture* Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Risque augmenté d'accident vasculaire cérébral et de mortalité chez les déments.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Olanzapine B P	ZYPREXA®	oui	important	5 mg 7,5 mg 10 mg	Cp. enrobé	A avaler avec de l'eau. Administrer à heure fixe. Ne pas écraser, ne pas croquer.	Inapproprié selon la liste de Beers 2012 et Priscus. Effets anticholinergiques et légers effets extrapyramidaux, parkinsonisme, hypotonie, sédation, risque de chute, augmentation de la mortalité chez les patients déments. Alternative thérapeutique : neuroleptique atypique avec une balance bénéfice/risque favorable (ex : risperdone). Surveillance clinique des effets indésirables notamment anticholinergiques ou extrapyramidaux, antécédent de chute, surveillance des fonctions neurologique et cognitive, surveillance de la fonction cardiovasculaire.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Olanzapine B P	ZYPREXA VELOTAB®	oui	important	5 mg 10 mg 15 mg 20 mg	Cp. orodispersible	Laisser fondre dans la bouche ou dissoudre dans de l'eau. A administrer à heure fixe immédiatement après ouverture de la plaquette.	Inapproprié selon la liste de Beers 2012 et Priscus. Effets anticholinergiques et léger effets extrapyramidaux, parkinsonisme, hypotonie, sédation, risque de chute, augmentation de la mortalité chez les patients déments. Alternative thérapeutique : neuroleptique atypique avec une balance bénéfice/risque favorable (ex : risperdone). Surveillance clinique des effets indésirables notamment anticholinergiques ou extrapyramidaux, antécédent de chute, surveillance des fonctions neurologique et cognitive, surveillance de la fonction cardiovasculaire.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Benzamide									
Tiapride	TIAPRIDAL®	oui	modéré / insuffisant	100 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *A administrer avant le repas.*	Si impossibilité d'avaler, préférer la solution buvable.	/!\	/!\
Tiapride	TIAPRIDAL®	non	modéré / insuffisant	5 mg/goutte	Sol. buvable en gouttes (fl. 30 ml)	Utiliser le flacon compte-goutte pour prélever.	*Conservation : 1 mois après ouverture* Tenir compte de la teneur en potassium.	/!\	/!\
Lithium									
Lithium	THERALITHE®	non	important	250 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours des repas.		/!\	
Lithium	TERALITHE®	non	important	400 mg	Cp. sécable à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer, ni sucer. A administrer au cours du repas.		/!\	

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres antipsychotiques									
Rispéridone	RISPERDAL®	oui	important	1 mg 2 mg 4 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau.		/!\	/!\
Rispéridone	RISPERDAL®	oui	important	1 mg/ml	Sol. buvable (fl. 30, 60, 120 ml)	A avaler après dilution dans une boisson.		/!\	/!\
Rispéridone	RISPERDAL® Constat LP	non	important	25 mg/2 ml 37,5 mg/2 ml 50 mg/2 ml	Susp. injectable à libération prolongée (poudre et solvant en seringue pré-remplie)	A administrer en IM profonde dans le muscle deltoïde ou fessier à l'aide de l'aiguille sécurisée appropriée.		/!\	/!\
Rispéridone	RISPERDAL® Oro	oui	important	0,5 mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg	Cp. orodispersible	Laisser fondre sur la langue ou avaler avec de l'eau.		/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anxiolytiques									
Dérivés de la benzodiazépine									
Alprazolam B L P	XANAX®	oui	important	0,25 mg 0,5 mg 1 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*	Inapproprié selon la liste Priscus, et à une dose > à 2 mg/j selon la liste de Beers et de Laroche. Balance bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable. Sensibilité aux effets indésirables accrue chez le sujet âgé. Risque de chute et de fracture, prolongement du temps de réaction, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive, dépression. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine à demi-vie courte, ou intermédiaire, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine). Traitement non médicamenteux : traitement des troubles du sommeil. Surveillance des effets indésirables. Initier le traitement à la moitié de la dose usuelle et traiter sur la plus courte durée possible.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Oxazépam B L P	SERESTA®	non	important	10 mg 50 mg	Comprimé Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*	Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche, et Priscus à une dose > à 60 mg/j. Balance bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable. Sensibilité aux effets indésirables accrue chez le sujet âgé. Risque de chute et de fracture, prolongement du temps de réaction, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive, dépression. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine à demi-vie courte, ou intermédiaire, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine). Traitement non médicamenteux : traitement des troubles du sommeil. Surveillance des effets indésirables. Initier le traitement à la moitié de la dose usuelle et traiter sur la plus courte durée possible.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Hypnotiques et sédatifs									
Médicaments reliés aux benzodiazépines									
Zolpidem B L P	STILNOX®	oui	important	10 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer immédiatement avant le coucher.	Inapproprié selon la liste de Beers 2012, de Laroche et Priscus à une dose > à 5 mg/j. Balance bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable. Pas d'amélioration de l'efficacité et plus de risque d'effets indésirables lors de l'augmentation de la dose journalière au-delà de la demi-dose proposée chez l'adulte jeune. Risque de chute et de fracture, délai de réaction augmenté, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine ou apparentés à demi-vie courte ou intermédiaire, à la dose < ou égale à la moitié de la dose proposée chez l'adulte jeune, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine).	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Zopiclone B L P	IMOVANE®	oui	important	3,75 mg 7,5 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer immédiatement avant le coucher.	Inapproprié selon la liste de Beers 2012, de Laroche et Priscus à une dose > à 3,75 mg/j. Balance bénéfice/risque défavorable et efficacité discutable. Pas d'amélioration de l'efficacité et plus de risque d'effets indésirables lors de l'augmentation de la dose journalière au-delà de la demi-dose proposée chez l'adulte jeune. Risque de chute et de fracture, délai de réaction augmenté, réaction psychiatrique, insuffisance cognitive. Alternatives thérapeutiques : benzodiazépine ou apparentés à demi-vie courte ou intermédiaire, à la dose < ou égale à la moitié de la dose proposée chez l'adulte jeune, valériane, antidépresseurs sédatifs (miansérine, mirtazapine). Traitement non médicamenteux : traitement des troubles du sommeil. Surveillance des effets indésirables. Initier le traitement à la dose la plus faible (la moitié de la dose usuelle) et sur la plus courte durée possible.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Psychoanaleptiques									
Antidépresseurs									
Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine									
Paroxétine [B]	DEROXAT®	oui	important	20 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. A administrer au cours du repas. *Le comprimé peut être écrasé pour être administré par sonde naso-gastrique.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. *Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.* Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Paroxétine [B]	DEROXAT®	non	important	20 mg/10 ml	Susp. buvable (fl.150 ml)	Agiter le flacon avant utilisation. A administrer au cours du repas. *En cas d'administration par sonde naso-gastrique, diluer dans de l'eau immédiatement avant administration.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Conservation : 1 mois après ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\
Citalopram [B]	SEROPRAM®	oui	important	20 mg	Cp. pelliculé sécable	A avaler avec de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Citalopram[B]	SEROPRAM®	non	important	40 mg/ml	Sol. buvable (fl. 12 ml)	Utiliser la seringue pour prélever. Dilution possible dans un peu d'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. *Conservation : 16 semaines après ouverture.* Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\
Escitalopram [B]	SEROPLEX®	oui	important	5 mg 10 mg 15 mg 20 mg	Cp. pelliculé sécable (sauf le 5 mg)	A avaler avec un peu d'eau. Ne pas croquer. *Possibilité de broyer les comprimés. Diluer dans de l'eau et administrer immédiatement.*	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Escitalopram [B]	SEROPLEX®	non	important	20 mg/ml	Sol. buvable (fl. 15 ml)	La solution buvable peut être mélangée à de l'eau.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 8 semaines après ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\
Sertraline [B]	ZOLOFT®	oui	important	25 mg 50 mg	Gélule	A administrer au cours du repas.	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.		/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres antidépresseurs									
Miansérine	Générique	oui	important	10 mg 30 mg 60 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas croquer. *Ecrasement possible des comprimés.*			/!\
Venlafaxine [B]	EFFEXOR®	oui	important	37,5 mg 75 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir, ni écraser, ni croquer ou dissoudre. *Ouverture possible de la gélule, ne pas écraser le contenu.*	Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\
Venlafaxine [B]	Générique	oui	important	50 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours du repas. *Ecrasement possible du comprimé.*	Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Mirtazapine[B]	NORSET®	oui	important	15 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau. Ne pas mâcher. Administrer à heure fixe. *Ecrasement possible du comprimé.*	Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\
Mirtazapine[B]	NORSET®	non	important	15 mg/ml	Sol. buvable (fl. 66 ml)	Utiliser la pompe doseuse pour préléver. Diluer dans un petit peu d'eau avant administration. Administrer à heure fixe.	Tenir compte de la teneur en éthanol. Conservation : 6 semaines après ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers 2012. Peut exacerber ou causer un syndrome inapproprié d'hormone antidiurétique ou une hyponatrémie. Surveillance étroite de la natrémie à l'initiation du traitement ou en cas de changement de dose.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments contre la démence									
Anticholinestérasiques									
Donépezil	ARICEPT®	oui	faible	5 mg 10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. *Ecrasement possible des comprimés.*			/!\
Donépezil	ARICEPT®	oui	faible	5 mg 10 mg	Cp. orodispersible	A laisser fondre sur la langue ou avaler avec de l'eau.			/!\
Rivastigmine	EXELON®	non	faible	4,6 mg/24 h 9,5 mg/24 h	Dispositif transdermique	A appliquer sur une peau saine, propre et sèche, sans pilosité, sur le haut ou le bas du dos, le haut du bras ou la poitrine, à un endroit où il ne risque pas d'être décollé par des vêtements.			/!\
Rivastigmine	EXELON®	oui	faible	1,5 mg 3 mg 6 mg	Gélule	A avaler avec de l'eau. Ne pas ouvrir la gélule. Ne pas écraser. A administrer au cours du repas.	Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable et un dispositif transdermique.	/!\	/!\
Rivastigmine	EXELON®	non	faible	2 mg/ml	Sol. buvable (fl. 50 ml)	Prélever à l'aide de la seringue doseuse. Utiliser pure ou diluer dans de l'eau. A administrer au cours du repas.	Conservation : 1 mois après ouverture.	/!\	/!\

Système nerveux	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Galantamine	REMINYL®	oui	faible	8 mg 16 mg 24 mg	Gélule à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas mâcher, ni écraser. A administrer au cours du repas.	Un apport liquidien adéquat est nécessaire pendant le traitement. Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.	/!\	/!\
Galantamine	REMINYL®	non	faible	4 mg 16 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours du repas.	Un apport liquidien adéquat est nécessaire pendant le traitement. Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.	/!\	/!\
Galantamine	REMINYL®	non	faible	4 mg/ml	Sol. buvable (fl. 100 ml)	Utiliser la seringue présente dans la boîte pour prélever puis diluer dans un peu d'eau. A administrer au cours du repas.	Un apport liquidien adéquat est nécessaire pendant le traitement. Conservation : 3 mois après ouverture	/!\	/!\
Autres médicaments contre la démence									
Mémantine	EBIXA®	non	faible	10 mg 20 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Administrer à heure fixe.	Si impossibilité d'avaler, il existe une solution buvable.	/!\	/!\
Mémantine	EBIXA®	non	faible	10 mg/ml (5 mg/pression)	Sol. buvable (fl. 50 ml)	Utiliser la pompe doseuse pour prélever. Dilution possible dans un peu d'eau. Administrer à heure fixe.	Conservation : 3 mois après ouverture.	/!\	/!\

R. Système respiratoire



Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Préparations nasales									
Décongestionnants et autres préparations à usage topique									
Corticoïdes									
Tixocortol	PIVALONE®	non	modéré	1%	Susp. nasale (fl. 10 ml)	A administrer en pulvérisation nasale.			

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes									
Adrénergiques pour inhalation									
Agonistes sélectifs β2-adrénergiques									
Formotérol	FORADIL®	non	important	12 µg	Poudre pour inhalation en gélule	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Ne pas avaler.			
Salbutamol	VENTOLINE® AIROMIR®	oui	important	100 µg/dose	Susp. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
Salbutamol	VENTOLINE®	oui	important	2,5 mg/2,5 ml 5 mg/2,5 ml	Sol. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer par voie inhalée exclusivement à l'aide d'un nébuliseur. Ne pas injecter, ne pas avaler. Dilution possible dans du sérum physiologique stérile.			
Terbutaline	BRICANYL Turbuhaler ®	oui	important	500 µg/dose	Poudre pour inhalation	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Terbutaline	BRICANYL®	oui	important	5 mg/2 ml	Sol. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer par voie inhalée exclusivement à l'aide d'un nébuliseur. Ne pas injecter, ne pas avaler. A diluer dans du sérum physiologique stérile.			
Adrénergiques en association									
Fénotérol + ipratropium	BRONCHODUAL ®	non	important	50 µg + 20 µg	Sol. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
Salmétérol + fluticasone	SERETIDE®	non	important	25 µg + 50 µg 25 µg + 125 µg 25 µg + 250 µg par dose	Susp. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Tenir le flacon verticalement. Se rincer la bouche après inhalation.			
Salmétérol + fluticasone	SERETIDE Diskus®	non	important	50 µg + 100 µg 50 µg + 250 µg 50 µg + 500 µg par dose	Poudre pour inhalation (unidose)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Tenir le flacon verticalement. Se rincer la bouche après inhalation.			
Autres médicaments pour syndromes obstructifs des voies aeriennes, par inhalation									
Glucocorticoïdes									
Béclométasone	BECOTIDE®	oui	important	250 µg/dose	Sol. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Béclométasone	QVARSPRAY® QVAR Autohaler ®	non	important	100 µg/dose	Sol. pour inhalation (fl. pressurisé)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
Béclométasone	MIFLASONE®	non	important	100 µg/dose 200 µg/dose 400 µg/dose	Poudre pour inhalation en gélule	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation. Ne pas avaler.			
Budésonide	PULMICORT® Turbuhaler	non	important	100 µg/dose 200 µg/dose 400 µg/dose	Poudre pour inhalation (unidose)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Se rincer la bouche après inhalation.			
Budésonide	PULMICORT®	oui	important	0,5 mg/2 ml 1 mg/2 ml	Susp. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Dilution possible dans du sérum physiologique stérile. Se rincer la bouche après inhalation. Ne pas injecter, ne pas avaler.			

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anticholinergiques									
Ipratropium bromure	ATROVENT®	oui non	important	0,5 mg/ 2ml 0,5 mg/1ml	Sol. pour inhalation par nébuliseur (unidose)	A administrer par inhalation à l'aide d'un nébuliseur. Diluer dans du sérum physiologique pour obtenir 5 ml. Ne pas mettre en contact avec l'oeil. Ne pas avaler, ne pas injecter.			
Tiotropium bromure	SPIRIVA®	non	important	18 µg/dose	Poudre pour inhalation en gélule	A administrer en inhalation buccale en position assise ou debout. Administrer à heure fixe. Ne pas avaler.		/!\	
Adrénergiques pour usage systémique									
Agonistes sélectifs β2-adrénergique à usage systémique									
Terbutaline	BRICANYL®	non	important	5 mg	Cp. à libération prolongée	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Administrer au cours d'un repas.			

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres									
Antagonistes des récepteurs de leucotriène									
Montélukast	SINGULAIR®	non	important	10 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ecrasement possible des comprimés à 5 mg (dosage enfant) Administrer au cours ou en dehors d'un repas.			/!\
Médicaments de la toux et du rhume									
Mucolytiques									
Acétylcystéine	MUCOMYST®	oui	insuffisant	200 mg	Sol. buvable (poudre en sachet)	A diluer dans de l'eau.	Tenir compte de la présence de sodium.		
Acétylcystéine	MUCOMYST®	oui	insuffisant	200 mg/5 ml	Susp. buvable (poudre)	A dissoudre dans de l'eau.	Tenir compte de la présence de sodium. Conservation : 12 jours après reconstitution.		
Acétylcystéine	FLUIMUCIL®	oui	insuffisant	200 mg	Sol. buvable (granulés en sachet)	A dissoudre dans de l'eau.			

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Acétylcystéine	FLUIMUCIL® (sans sucre)	oui	insuffisant	2% (2g/100ml)	Sol. buvable (fl. 200 ml)	Utiliser le goblet doseur.	Tenir compte de la présence de sodium. Conservation : 12 jours après reconstitution.		
Carbocistéine	BRONCHOKOD® (sans sucre)	oui	insuffisant	5% (5g/100ml)	Sol. buvable (fl. 250 ml)	A avaler à l'aide de la cuillère mesure.	Tenir compte de la présence de sodium. *Conservation : ne pas conserver au-delà de la durée du traitement.*		
Antitussifs									
Hélicidine	HELICIDINE®	non	faible	0,5 ml/5 ml	Sirop (fl. 125, 250 ml)	A avaler à l'aide de la cuillère mesure.	Tenir compte de la teneur en sucre. *Conservation : 6 mois après ouverture.*		
Antihistaminiques à usage systémique									
Dérivé de la pipérazine									
Lévocetirizine	XYZALL®	oui	modéré	5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau . Ne pas écraser, ne pas croquer. Ecrasement possible des comprimés. Administrer immédiatement après broyage.		/!\	

Système respiratoire	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres antihistaminiques à usage systématique									
Desloratadine	AERIUS®	oui	modéré	5 mg	Cp. pelliculé	A avaler avec de l'eau. Ne pas écraser, ne pas croquer. Ecrasement possible des comprimés. Administration possible de la poudre dans la sonde entérale.	Si impossibilité d'avaler préférer la solution buvable 0,5 mg/ml.	/!\	
Desloratadine	AERIUS®	oui	modéré	0,5 mg/ml	Sol. buvable (fl. 125 ml)	Avaler la dose de solution buvable prélevée à l'aide de la seringue graduée. Prendre un verre d'eau après la prise.	Conservation : 3 mois après ouverture.	/!\	
Loratadine	CLARITYNE®	oui	modéré	10 mg	Comprimé	A avaler avec de l'eau.			/!\
Loratadine	CLARITYNE®	oui	modéré	1mg/ml	Sirop (fl. 60, 120 ml)	A avaler à l'aide de la cuillère mesure.	Conservation : 1 mois après ouverture.		/!\

S. Organes sensoriels

Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Médicaments ophtalmologiques									
Anti-inflammatoires									
Anti-inflammatoires non stéroïdiens									
Indométacine B L P	INDOCOLLYRE®	non	important	0.10%	Collyre (fl. 5 ml ou unidose)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK. Conservation : 15 jours après ouverture. Inapproprié selon la liste de Beers, de Laroche et Priscus. Risque d'hémorragies gastro-instestinales, d'ulcération, de perforation, de troubles du système nerveux central en cas de passage systémique. Surveillance des manifestations gastro-intestinales, de la fonction rénale, cardiovasculaire.	/!\	/!\

Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Anti-inflammatoires et anti-infectieux en association									
Corticoïdes et anti-infectieux en association									
Dexaméthasone + oxytétracycline	STERDEX®	non	modéré	0,267 mg + 1,335 mg	Pommade ophtalmique (unidose)	Appliquer la pommade dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'oeil et éventuellement sur le bord de la paupière. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Contrôler l'INR en cas d' association avec les AVK.		
Antiglaucomateux et myotiques									
Parasympathomimétiques									
Pilocarpine	PILO®	non	important	2%	Collyre (fl. 10 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
Pilocarpine	ISOPTO-PILOCARPINE®	non	important	0,50% 1% 2%	Collyre (fl. 10 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 15 jours après ouverture.		

Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique									
Acétazolamide	DIAMOX®	non	important	250 mg	Cp. sécable	A avaler avec de l'eau. A administrer au cours d'un repas. *Ecrasement possible des comprimés. A administrer avec un aliment pour masquer l'amertume.*		/!\	/!\
Bétabloquants									
Timolol	TIMABAK®	oui	important	0,25% 0,50%	Collyre (fl. 5 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 8 semaines après ouverture.	/!\	/!\
Timolol	TIMOPTOL®	oui	important	0,25% 0,5%	Collyre (fl. 3 ml) Collyre à libération prolongée (fl. 2,5 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.	/!\	/!\
Analogues de prostaglandine									
Latanoprost	XALATAN®	non	important	0.005%	Collyre (fl. 2,5 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
Autres médicaments ophtalmologiques									
Carbomère	LACRIGEL®	non	important	0.20%	Gel ophtalmique (tb. 5, 10 g)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		

Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Carbomère	GEL LARMES®	non	important	0.30%	Gel ophtalmique (tb. 10 g, unidose)	Instiller dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
Larmes artificielles	LARMABAK®	non	important	0.90%	Collyre (fl. 10 ml)	En instillation oculaire. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 8 semaines après ouverture.		
Rétinol	VITAMINE A DULCIS ®	non	modéré	25 000 UI/100 g	Pommade ophtalmique (tb. 10 g)	Appliquer l'équivalent d'un grain de riz dans le cul de sac conjonctival. A administrer à distance d'autres médicaments par voie oculaire (minimum 15 minutes).	Conservation : 4 semaines après ouverture.		
Médicaments otologiques									
Anti-infectieux									
Ofloxacine	OFLOCET®	oui	important	1,5 mg/0,5 ml	Sol. auriculaire (unidose)	Instillation auriculaire. Maintenir la tête penchée sur le côté pendant environ 5 minutes, afin de faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif externe.			
Rifamycine	OTOFA®	non	important	3%	Sol. auriculaire (fl. 10 ml)	En instillation dans le conduit auditif ou sous forme de bains d'oreille de quelques minutes avec la solution tiédie pure.	Conservation : ne pas conserver au-delà de la durée du traitement.		

Organes sensoriels	Spécialités de référence Dénomination commerciale	Générique	SMR	Dosages	Formes galéniques	Modalités d'administration	Sélection d'informations utiles	IR	IH
Autres médicaments otologiques									
Xylène	CERULYSE®	non	non remboursé	5%	Sol. auriculaire (fl. 10 ml)	Instiller quelques gouttes ou procéder à un bain d'oreille. Réchauffer le flacon entre les mains avant l'emploi.	Conservation : 4 semaines après ouverture.		

INDEX DES MOLECULES

par ordre alphabétique

par classe anatomique

Acide ascorbique	classe A
Acébutolol	classe C
Acénocoumarol	classe B
Acétazolamide	classe S
Acétylcystéine	classe R
Aciclovir	classe D
Aciclovir	classe J
Acide fusidique	classe D
Acide acétylsalicylique	classe B
Acide alendronique	classe M
Acide alendronique + colécalciférol	classe M
Acide clodronique	classe M
Acide folique	classe B
Acide fusidique	classe J
Acide risédronique	classe M
Acide valproïque	classe N
Alfuzosine	classe G
Allopurinol	classe M
Alprazolam	classe N
Amiodarone	classe C
Amlodipine	classe C
Amorolfine	classe D
Amoxicilline	classe J
Amoxicilline + acide clavulanique	classe J
Amphotéricine B	classe J
Anastrozole	classe L
Aténolol	classe C
Atorvastatine	classe C
Azithromycine	classe J
Béclométasone	classe R
Benazepril + hydrochlorothiazide	classe C
Bétaméthasone	classe D
Bétaméthasone	classe H
Bétaméthasone + acide salicylique	classe D
Bicalutamide	classe L
Bicarbonate de sodium + alginate	classe A
Bicarbonate de sodium + bitartrate de potassium	classe A
Bifonazole	classe D
Bisoprolol	classe C
Budésonide	classe R
Bumétanide	classe C
Calcipotriol	classe D

Calcipotriol + bétaméthasone	classe D
Candésartan	classe C
Carbamazépine	classe N
Carbimazole	classe H
Carbocistéine	classe R
Carbomère	classe S
Carbonate de calcium	classe A
Carbonate de calcium + colécalciférol	classe A
Carvédilol	classe C
Céfixime	classe J
Cefpodoxime	classe J
Ceftriaxone	classe J
Céfuroxime	classe J
Céliprolol	classe C
Cérat de Galien	classe D
Chlorhexidine + chlorobutanol	classe A
Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium + alcool benzylique	classe D
Ciclétanine	classe C
Ciclopirox	classe D
Ciprofloxacine	classe J
Citalopram	classe N
Clarithromycine	classe J
Clobétasol	classe D
Clopidogrel	classe B
Cloxacilline	classe J
Clozapine	classe N
Codéine + paracétamol	classe N
Colchicine + Tiémonium + Opium	classe M
Colécalciférol	classe A
Cyanocobalamine	classe B
Cyprotérone	classe G
Desloratadine	classe R
Désonide	classe D
Dexaméthasone + oxytétracycline	classe S
Diclofénac	classe M
Digoxine	classe C
Diltiazem	classe C
Diosmectite	classe A
Dompéridone	classe A
Donépezil	classe N
Doxycycline	classe J
Dutastéride	classe G
Econazole	classe D
Econazole	classe G
Enalapril	classe C
Enoxaparine	classe B
Entacapone	classe N
Ergocalciférol	classe A
Escitalopram	classe N
Esoméprazole	classe A
Fénotérol + ipratropium	classe R
Fentanyl	classe N
Fluconazole	classe J
Fluindione	classe B
Fondaparinux	classe B
Formotérol	classe R
Fumarate ferreux	classe B
Furosémide	classe C
Gabapentine	classe N
Galantamine	classe N
Gliclazide	classe A
Glucagon	classe H
Glycérol + vaseline + paraffine liquide	classe D

Gomme sterculia	classe A
Hélicidine	classe R
Héparine calcique	classe B
Huile de paraffine	classe A
Hydrochlorothiazide	classe C
Hydrocortisone	classe H
Hydrocortisone	classe D
Hypochlorite de sodium	classe D
Ibuprofène	classe M
Indapamide	classe C
Indométacine	classe S
Insuline asparte (action intermédiaire)	classe A
Insuline asparte (action rapide)	classe A
Insuline détémir	classe A
Insuline glargine	classe A
Insuline glulisine	classe A
Insuline humaine recombinante isophane	classe A
Insuline humaine recombinante solution	classe A
Insuline humaine recombinante solution et isophane	classe A
Insuline lispro (action intermédiaire)	classe A
Insuline lispro (action rapide)	classe A
Ipratropium bromure	classe R
Irbésartan	classe C
Isosorbide dinitrate	classe C
Isosorbide mononitrate	classe C
Kétoconazole	classe D
Lactulose	classe A
Lamotrigine	classe N
Lanzoprazole	classe A
Larmes artificielles	classe S
Latanoprost	classe S
Lercanidipine	classe C
Létrozole	classe L
Leuproréline	classe L
Lévocetirizine	classe R
Lévodopa + bensérazide	classe N
Lévodopa + carbidopa	classe N
Lévodopa + carbidopa + entacapone	classe N
Lévofloxacine	classe J
Lévothyroxine	classe H
Lidocaïne	classe N
Lidocaïne + prilocaïne	classe N
Lisinopril	classe C
Lisinopril + hydrochlorothiazide	classe C
Lithium	classe N
Loratadine	classe R
Losartan	classe C
Loxapine	classe N
Macrogol (3350) + bicarbonate de sodium + chlorure de potassium + chlorure de sodium	classe A
Macrogol (4000)	classe A
Mémantine	classe N
Metformine	classe A
Méthylprednisolone	classe H
Métoprolol	classe C
Métronidazole	classe G
Métronidazole	classe J
Miansérine	classe N
Mirtazapine	classe N
Molsidomine	classe C
Montélukast	classe R
Morphine chlorhydrate	classe N
Morphine sulfate	classe N

Nébivolol	classe C
Néfopam	classe N
Nicardipine	classe C
Nicorandil	classe C
Nitrofurantoïne	classe J
Norfloxacine	classe J
Ofloxacine	classe J
Ofloxacine	classe S
Olanzapine	classe N
Oméprazole	classe A
Oseltamivir	classe J
Oxazépam	classe N
Oxyde de zinc	classe D
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate	classe C
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate +lidocaïne	classe C
Oxyde de zinc + glycérol + talc	classe D
Oxyde de zinc + huile de foie de poisson	classe D
Pantoprazole	classe A
Paracétamol	classe N
Paroxétine	classe N
Périndopril	classe C
Périndopril + indapamide	classe C
Phloroglucinol	classe A
Phosphate monosodique et disodique	classe A
Phytoménadione	classe B
Pilocarpine	classe S
Piribédil	classe N
Potassium chlorure	classe A
Potassium gluconate	classe A
Poudre de pancréas	classe A
Povidone iodée	classe G
Povidone iodée	classe D
Pramipéxole	classe N
Pravastatine	classe C
Prednisone	classe H
Prégabaline	classe N
Pristinamycine	classe J
Promestriène	classe G
Propranolol	classe C
Psyllium	classe A
Racécadotril	classe A
Ramipril	classe C
Répaglinide	classe A
Rétinol	classe S
Rifamycine	classe S
Rispéridone	classe N
Rivastigmine	classe N
Ropinirole	classe N
Rosuvastatine	classe C
Roxithromycine	classe J
Salbutamol	classe R
Salmétérol + fluticasone	classe R
Scopolamine	classe A
Serenoa repens	classe G
Sertraline	classe N
Simvastatine	classe C
Sorbitol + citrate de sodium + laurylsulfoacétate de sodium	classe A
Sotalol	classe C
Spiramycine	classe J
Spironolactone	classe C
Spironolactone + altizide	classe C
Sulfaméthoxazole + triméthoprime	classe J
Sulfate ferreux	classe B

Sulfate ferreux + acide folique	classe B
Tamoxifène	classe L
Tamsulosine	classe G
Terbutaline	classe R
Terbutaline (pour inhalation)	classe R
Terbutaline (pour usage systémique)	classe R
Tiapride	classe N
Timolol	classe S
Tinzaparine	classe B
Tiotropium bromure	classe R
Tixocortol	classe R
Tramadol + paracétamol	classe N
Triéthanolamine	classe D
Trinitrine (action immédiate)	classe C
Trinitrine (action prolongée)	classe C
Trospium	classe G
Valaciclovir	classe J
Valpromide	classe N
Valsartan	classe C
Valsartan + hydrochlorothiazide	classe C
Vaseline	classe D
Venlafaxine	classe N
Vérapamil	classe C
Warfarine	classe B
Xylène	classe S
Zolpidem	classe N
Zopiclone	classe N